



SALUD DE PERSONAS MIGRANTES INTERNACIONALES

SERIE DE REPORTE

MINISTERIO DE SALUD DE CHILE

RESULTADOS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO PARTE 4

Resultados REM 2015 y 2016

Febrero del 2018



Este documento está tomado del informe final del estudio original:

SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN PILOTO NACIONAL DE SALUD DE MIGRANTES INTERNACIONALES

Licitación 757-13-LE17
Ministerio de Salud de Chile

Santiago, 28 de febrero del 2018

Comité Técnico Licitación, Ministerio de Salud de Chile y Superintendencia de Salud:

Josette Iribarne
Andrea Fernández
Violeta Rojas
Claudia Padilla
Marcela Pezoa
Viviana Reyes

El comité técnico agradece el trabajo de los siguientes expertos que participaron directamente de la elaboración de esta sección del informe, del Programa de Estudios Sociales en Salud, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina Universidad del Desarrollo, y de la Organización Internacional para las Migraciones:

Báltica Cabieses, PhD
Cecilia Canales, BSc
Macarena Chepo, MSc
Sofía Astorga, MSc
Alex Alarcón, PhD
Félix Martínez, MSc(c)

Resumen ejecutivo

Dada las necesidades de información que día a día se enfocan en fortalecer el principio estadístico de oportunidad e integridad de la información emanada desde el lugar de origen de la actividad y/o población, se hace necesario la estandarización de la información de estadísticas de salud a nivel nacional, lo que se traduce en los registros REM.

Se realizó un análisis descriptivo comparativo de la información registrada por cada una de las regiones y de uno de los establecimientos de los 29 Servicios de Salud distribuidos a lo largo del país para los años 2015 y 2016, entre la población chilena y la población inmigrante. Esta información registrada contempla los registros acumulados del primer (mes 6) y segundo semestre (mes 12), por lo que se ha caracterizado el acumulado del segundo semestre, considerando que estos datos compilan la totalidad de personas atendidas durante al final de cada año.

Principales resultados para ambos años:

- Programa salud de la mujer:
 - o La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en este programa se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13). La segunda región con más atenciones corresponde a la Región 1, seguida muy de cerca por la Región 2 de atenciones de inmigrantes para este programa.
 - o Los métodos de regulación más utilizados en la población inmigrante son el Hormonal inyectable combinado seguido del Hormonal inyectable progestágeno y el Hormonal Oral Combinado, mientras que en la población chilena los más frecuente son el Hormonal Oral Combinado seguido por el Dispositivo Intrauterino y por el Hormonal inyectable combinado.
 - o La mayor concentración de gestantes inmigrantes en control con riesgo psicosocial se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13). La segunda región con más atenciones corresponde a la Región 2, seguida muy de cerca por la Región 1.
 - o En migrantes se observa menos embarazo en 15-19 años que chilenas en riesgo psicosocial.
- Programa de salud del niño:
 - o La mayor concentración de niños 0-9 años inmigrantes que se atienden en este programa se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13). La segunda región con más atenciones corresponde a la Región 1, seguida de la región 2.
 - o También es posible observar que la mayor parte de los niños inmigrante tiene un Diagnóstico Nutricional Integrado de Normal, seguido de aquellos que son diagnosticados Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad. En la población chilena, el diagnóstico es bastante similar, puesto que la mayoría de los niños en control son

diagnosticados como Normal, seguido de aquellos niños que son diagnosticados con Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad.

- Control otros programas (por patologías y/o condiciones, tales como asma bronquial y artrosis de cadera y rodilla):
 - o La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en estos programas se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13). La segunda región con más atenciones corresponde a la Región XII, seguida de la región IX.
 - o La patología más frecuente en los hombres inmigrantes a nivel país y en control es el Asma Bronquial Leve, seguida de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Tipo A y de la Artrosis de Cadera y Rodill.
 - o Con respecto a la distribución de aquellos hombres con algún tipo de dependencia según el índice de Barthel, la Dependencia Severa No oncológica es la más frecuente en hombres inmigrantes y también es la más frecuente en los hombres chilenos.
 - o La patología más frecuente en las mujeres inmigrantes a nivel país, es la Artrosis de Cadera y Rodilla seguida del Asma Bronquial Leve (y de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Tipo A).
 - o Con respecto a la distribución de aquellas mujeres con algún tipo de dependencia según el índice de Barthel, la Dependencia Severa No oncológica es la más frecuente en mujeres inmigrantes y también es la más frecuente en las mujeres chilenas.

- Programa de salud cardiovascular:
 - o La mayor concentración de inmigrantes que se atiende en el Programa de Salud Cardiovascular se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13). La segunda región con más atenciones corresponde a la Región 9, seguida de la Región 3.
 - o Del total de hombres inmigrantes en este programa, la mayoría se clasifican riesgo cardiovascular alto. En el caso de hombres chilenos, la situación es bastante similar, puesto que la mayoría también se clasifican con riesgo cardiovascular alto.
 - o Del total de mujeres inmigrantes en este programa, la mayoría se clasifican con riesgo cardiovascular moderado. En el caso de mujeres chilenas, la mayoría se clasifican con riesgo cardiovascular alto. Para ambas clasificaciones la diferencia entre mujeres inmigrantes y chilenas es significativa.
 - o Respecto de metas de compensación, existen más hombres chilenos en control por hipertensión y normotensos comparado con misma población en personas migrantes internacionales y más hombres chilenos con hemoglobina glicosilada menor a 7% que los mismos en migrantes internacionales. No obstante, una menor proporción de hombres chilenos en control reportó LDL menor a 100 comparado con hombres migrantes, en todos estos casos con diferencias significativas entre los grupos de comparación.
 - o Se observan diferencias significativas a favor de las mujeres chilenas en control por hipertensión comparado con migrantes internacionales para el total del país, tanto para valores de PA en rangos normales como en HbA1C menor a 7%,



respectivamente. Similar a los hombres, más mujeres migrantes reportaron colesterol LDL menor a 100 comparado con mujeres chilenas.

- Programa de salud del adulto mayor:
 - o Respecto de control por funcionalidad, para el total del país no se observan diferencias significativas entre migrantes internacionales y locales, hombres y mujeres por separado, respecto del control por condición de funcionalidad. En ambos se observa una mayor proporción de persona con riesgo de dependencia.
 - o Respecto del programa control en programa "más adultos mayores autovalentes" por condición de funcionalidad, existen escasos datos de población migrante internacional en control de programa más adultos autovalentes por condición de funcionalidad. Similar a la sección anterior, en población local la mayoría de los asistentes a control son del tipo autovalente con riesgo, tanto en hombres como mujeres.
 - o Sobre control nutricional del adulto mayor, se observa que la mayor proporción de población bajo control por estado nutricional se encuentra en estado normal, tanto para hombres como para mujeres.

- Programa de salud mental en APS y especialidad:
 - o Los valores relativos sugieren mayor proporción de hombres migrantes agresores y con consumo riesgoso de drogas que hombres chilenos, pero los valores absolutos son muy bajos como para una interpretación más amplia y formal de estos resultados.
 - o Los tres principales diagnósticos de salud mental en APS en hombres migrantes son trastornos ansiosos, trastornos hipercinéticos y depresión leve. En estos tres casos los porcentajes son superiores en hombres migrantes comparado con hombres chilenos. En mujeres el trastorno ansioso y la depresión leve son los problemas más reportados, en ambos casos con proporciones superiores a mujeres chilenas.
 - o En hombres el principal diagnóstico en control de especialidad es trastornos ansiosos. En mujeres el trastorno ansioso es el problema más reportado.

- Programa de VIH/SIDA:
 - o De acuerdo a los registros REM 2015, existen 606 personas migrantes internacionales con VIH y SIDA, contra más de 23 mil personas nacidas en Chile, de las cuales 521 están con terapia antirretroviral y 85 sin terapia antirretroviral.
 - o El 2015 hubo 824 mujeres en atención de control por comercio sexual y que eran migrantes internacionales, comparado con 2933 de mujeres de origen chileno.



Antecedentes

Dada las necesidades de información que día a día se enfocan en fortalecer el principio estadístico de oportunidad e integridad de la información, emanada desde el lugar de origen de la actividad y/o población se hace necesario la estandarización de la información de estadísticas de salud a nivel nacional, lo que se traduce en los registros REM.

Estos registros, constituyen fuente oficial de información estadística de carácter nacional, que permite conocer las atenciones y actividades de salud otorgadas a la población en los establecimientos de la Red Asistencial, los cuales son requeridos para la gestión central y local. Además, son una fuente de diversos indicadores de Gestión y Cumplimiento de Programas, pilar fundamental para la toma de decisiones en salud.

Para el caso de la producción de actividades la periodicidad es mensual, mientras que para el caso de la población en control corresponde al censo poblacional que se efectúa dos veces en el año (Junio y Diciembre), la periodicidad es semestral.



Organización Internacional para las Migraciones
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración



Descripción de la base de datos

Fortalezas y limitaciones de los registros

Si bien los registros REM constituyen una fuente oficial de información estadística de carácter nacional, que permite conocer las atenciones y actividades de salud otorgadas a la población en los establecimientos de la Red Asistencial, carecen de claridad con respecto a la codificación utilizada por los establecimientos en el registro de información faltante, por lo que no se identifica si las celdas sin información corresponden a datos faltantes o a cero personas registradas.

La información relativa a población inmigrante registrada en la Serie P es débil, y no permite realizar análisis estratificados por grupos de edad y por sexo. Si bien es un inicio para poder conocer la frecuencia de prestaciones a las que accede la población inmigrante, es importante lograr conocer más al respecto considerando que esta población ha ido en aumento durante los últimos años y la atención de salud de estas personas aumentará la carga del Sistema Público Chileno.

Metodología de análisis

Se realizó un análisis descriptivo comparativo de la información registrada por cada una de las regiones y de uno de los establecimientos de los 29 Servicios de Salud (cada vez que fue posible) distribuidos a lo largo del país para los años 2015 y 2016, entre la población chilena y la población inmigrante.

Esta información registrada contempla los registros acumulados del primer (mes 6) y segundo semestre (mes 12), por lo que se ha caracterizado el acumulado del segundo semestre, considerando que estos datos compilan la totalidad de personas atendidas durante al final de cada año.

Las comparaciones realizadas entre la población chilena y la población migrante para cada uno de los Programas, Secciones y prestaciones de la Serie P, consideran descripciones a nivel país, Región y por Servicio de Salud.

Los valores mostrados en la columna % de Inmigrantes muestran la distribución de los Inmigrantes según prestación, considerando como 100% el Total general de Inmigrantes. Los valores mostrados en la columna % chilenos, son análogos a los mostrados en la columna % de Inmigrantes.

Para las comparaciones, se evaluó la significancia de las diferencias de las proporciones entre población inmigrante y población chilena para cada una de las prestaciones de Programas con información registrada de inmigrantes.

Los registros faltantes, es decir las celdas en las que no se registraron datos por parte de los Establecimientos de los 29 servicios de Salud, fueron excluidos del análisis, por lo que existen prestaciones para las cuales no fue posible realizar comparaciones entre población chilena e inmigrantes. Esta información se puede visualizar en las tablas de resumen a través de celdas en blanco.



A. RESULTADOS REM 2015

P1: Programa de Salud de la Mujer

El programa Salud de la Mujer, está compuesto por 8 secciones, distribuidas según las siguientes prestaciones:

Sección A: Población en control según método de regulación de fertilidad

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P1010100 | Población en control, según método de regulación de fertilidad - D.I.U. |
| P1060124 | Población en control, según método de regulación de fertilidad - D.I.U. medicado |
| P1010201 | Población en control, según método de regulación de fertilidad - hormonal - oral combinado |
| P1010202 | Población en control, según método de regulación de fertilidad - hormonal - oral progestágeno |
| P1010203 | Población en control, según método de regulación de fertilidad - hormonal - inyectable combinado |
| P1040508 | Población en control, según método de regulación de fertilidad - hormonal - inyectable progestágeno |
| P1040500 | Población en control, según método de regulación de fertilidad - hormonal - implante |
| P1010301 | Población en control, según método de regulación de fertilidad - preservativo - mujer |
| P1010302 | Población en control, según método de regulación de fertilidad - preservativo - hombres |
| P1060010 | Población en control, según método de regulación de fertilidad - mujeres en control que padecen enfermedad cardiovascular (dm-hta) |
| P1060020 | Población en control, según método de regulación de fertilidad - mujeres con retiro de implante anticipado en el semestre (antes de los 3 años) |
| P1060090 | Población en control, según método de regulación de fertilidad - método de regulación de fertilidad más preservativo |

Sección B: Gestantes en control con riesgo psicosocial

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P1020100 | Gestantes en control y con riesgo psicosocial - menos de 15 años |
| P1020200 | Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 15 - 19 años |
| P1040501 | Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 20 - 24 años |
| P1060100 | Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 25 - 29 años |
| P1060101 | Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 30 - 34 años |
| P1060102 | Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 35 - 39 años |
| P1060103 | Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 40 - 44 años |
| P1060104 | Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 45 - 49 años |
| P1060105 | Gestantes en control y con riesgo psicosocial - 50 - 54 años |

Sección C: Gestantes en riesgo psicosocial con visita domiciliaria integral realizada en el semestre

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P1040502 | Gestantes en riesgo psicosocial con visita domiciliaria integral realizada en el semestre - 1 visita |
| P1040503 | Gestantes en riesgo psicosocial con visita domiciliaria integral realizada en el semestre - 2 visitas |
| P1040504 | Gestantes en riesgo psicosocial con visita domiciliaria integral realizada en el semestre - 3 visitas |
| P1040505 | Gestantes en riesgo psicosocial con visita domiciliaria integral realizada en el semestre - 4 y más visitas |

Sección D: Gestantes y mujeres de 8^o mes post-parto en control, según estado nutricional

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P1030101 | Gestantes y mujeres de 8 ^o mes post-parto en control, según estado nutricional - gestantes en control- obesa |
| P1030102 | Gestantes y mujeres de 8 ^o mes post-parto en control, según estado nutricional - gestantes en control- sobrepeso |
| P1030103 | Gestantes y mujeres de 8 ^o mes post-parto en control, según estado nutricional - gestantes en control- normal |
| P1030104 | Gestantes y mujeres de 8 ^o mes post-parto en control, según estado nutricional - gestantes en control- bajo peso |
| P1030201 | Gestantes y mujeres de 8 ^o mes post-parto en control, según estado nutricional - control al 8 ^o mes post parto- obesa |
| P1030202 | Gestantes y mujeres de 8 ^o mes post-parto en control, según estado nutricional - control al 8 ^o mes post parto- sobrepeso |
| P1030203 | Gestantes y mujeres de 8 ^o mes post-parto en control, según estado nutricional - control al 8 ^o mes post parto- normal |
| P1030204 | Gestantes y mujeres de 8 ^o mes post-parto en control, según estado nutricional - control al 8 ^o mes post parto- bajo peso |

Sección E: Mujeres y gestantes en control con consulta nutricional

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P1050100 | Mujeres y gestantes en control con consulta nutricional - gestantes con malnutrición por déficit - bajo peso |
| P1050101 | Mujeres y gestantes en control con consulta nutricional - gestantes con malnutrición por exceso - obesa |
| P1050102 | Mujeres y gestantes en control con consulta nutricional - gestantes con malnutrición por exceso - sobrepeso |
| P1050103 | Mujeres y gestantes en control con consulta nutricional - mujeres en 3er mes post parto |
| P1050104 | Mujeres y gestantes en control con consulta nutricional - mujeres en 6to mes post parto |

Sección F: Mujeres en control de climaterio

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P1030301 | Mujeres en control de climaterio - población en control |
| P1060040 | Mujeres en control de climaterio - mujeres con pauta aplicada mrs |
| P1060050 | Mujeres en control de climaterio - mujeres con puntaje elevado de mrs |
| P1060060 | Mujeres en control de climaterio - mujeres con aplicación de terapia hormonal de reemplazo según mrs |

Sección G: Gestantes en control con ecografía por trimestre de gestación (en el semestre)

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P1060106 | Gestantes en control con ecografía por trimestre de gestación (en el semestre)-menor 15 años |

| | |
|-----------------|--|
| P1060107 | Gestantes en control con ecografía por trimestre de gestación (en el semestre)- 15 a 19 años |
| P1060108 | Gestantes en control con ecografía por trimestre de gestación (en el semestre)- 20 a 24 años |
| P1060109 | Gestantes en control con ecografía por trimestre de gestación (en el semestre)- 25 a 29 años |
| P1060110 | Gestantes en control con ecografía por trimestre de gestación (en el semestre)- 30 a 34 años |
| P1060111 | Gestantes en control con ecografía por trimestre de gestación (en el semestre)- 35 a 39 años |
| P1060112 | Gestantes en control con ecografía por trimestre de gestación (en el semestre)- 40 a 44 años |
| P1060113 | Gestantes en control con ecografía por trimestre de gestación (en el semestre)- 45 a 49 años |
| P1060114 | Gestantes en control con ecografía por trimestre de gestación (en el semestre)- 50 a 54 años |

Sección H: población en control por patologías de alto riesgo obstétrico

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P1030303 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - preeclamsia (pe) y she |
| P1060070 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - otro síndrome hipertensivo del embarazo (she) |
| P1030304 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - síntomas parto prematuro |
| P1030401 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - retardo crecimiento intra uterino (rciu) |
| P1040506 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - sífilis |

| | |
|-----------------|---|
| P1040507 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - vih |
| P1060115 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - diabetes pregestacional |
| P1060116 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - diabetes gestacional |
| P1030403 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - cesárea anterior |
| P1060080 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico - malformación congénita |
| P1060117 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -anemia |
| P1060118 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -cardiopatías |
| P1060119 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -pielonefritis |
| P1060120 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -rh(-) sensibilizada |
| P1060121 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -placenta previa |
| P1060122 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -chagas |
| P1060123 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -colestacia intrahepática de embarazo |
| P1030404 | Población en control por patologías de alto riesgo obstétrico -otras patologías del embarazo |

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos relativos a población inmigrante solo para las secciones A y B, por lo que los resúmenes entregados solo corresponderán a estas secciones.

Sección A: Población en control según método de regulación de fertilidad.

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, corresponde a las personas que se atienden en el Programa de Regulación de Fertilidad, en establecimientos con nivel primario de atención, según los siguientes métodos anticonceptivos: Dispositivo Intrauterino de cobre y Dispositivo Intrauterino Medicado P1010100, Hormonal (Oral combinado P1010201 y progestágeno P1010202, Inyectable combinado P1010203 y progestágeno P1010508 e Implante P1040500) y Preservativo (Mujer P1010301 y Hombre P1010302). También se registra el número de mujeres en control que padecen enfermedad cardiovascular (DM-HTA) P1060010, el número de mujeres con retiro de implante anticipado (antes de los 3 años) P1060020 y las personas con método de regulación de fertilidad más preservativo P1060090.

La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en este programa se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 69,91% (12.553). La segunda región con más atenciones concentra un 9,35% (1.622) y corresponde a la Región 1, seguida muy de cerca por la Región 2 con una concentración del 8,25% (1.607) del total de atenciones de inmigrantes para este programa.

Tabla 1. Distribución de población inmigrante atendida en el Programa de Regulación de la Fertilidad. 2015

| Región | Total Inmigrantes | % Inmigrantes |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 1622 | 9,35% |
| 2 | 1607 | 8,25% |
| 3 | 635 | 3,54% |
| 4 | 124 | 0,69% |
| 5 | 199 | 1,11% |
| 6 | 54 | 0,30% |
| 7 | 7 | 0,04% |
| 8 | 81 | 0,45% |
| 9 | 384 | 2,14% |
| 10 | 124 | 0,69% |
| 11 | 1 | 0,01% |
| 12 | 121 | 0,67% |
| 13 | 12553 | 69,91% |
| 14 | 33 | 0,18% |
| 15 | 410 | 2,28% |
| Total Inmigrantes | 17955 | 100% |

Elaboración propia.

Tabla 2. Población inmigrante y de chilenos en control según método de regulación de fertilidad, total país, año 2015.

| Método | Población Inmigrantes | % Inmigrantes | Población Chilenos | % Chilenos | Total General | p-value |
|--|-----------------------|---------------|--------------------|------------|----------------|---------|
| D.I.U | 2039 | 11,36% | 336322 | 23,80% | 338361 | 0.0000 |
| H.O combinado | 3324 | 18,51% | 410252 | 29,04% | 413576 | 0.0000 |
| H.O progestágeno | 1396 | 7,77% | 112770 | 7,98% | 114166 | 0.3103 |
| H.I. combinado | 4139 | 23,05% | 207496 | 14,69% | 211635 | 0.0000 |
| Preservativo mujer | 938 | 5,22% | 49155 | 3,48% | 50093 | 0.2145 |
| Preservativo hombres | 30 | 0,17% | 8050 | 0,57% | 8080 | 0.3584 |
| H. implante | 2489 | 13,86% | 161878 | 11,46% | 164367 | 0.9532 |
| H.I. progestágeno | 3600 | 20,05% | 126975 | 8,99% | 130575 | 0.0000 |
| Mujeres en control que padecen enfermedad Cardiovascular (DMHTA) | 491 | 2,73% | 48540 | 3,44% | 49031 | 0.0000 |
| Mujeres con retiro de Implante Anticipado en el semestre (antes de los 3 años) | 44 | 0,25% | 3933 | 8,10% | 3977 | 0.3996 |
| Método de Regulación de Fertilidad más Preservativo | 758 | 4,22% | 33267 | 845,84% | 34025 | 0.0000 |
| Total general | 17955 | | 1412898 | | 1430853 | |

Elaboración propia.



Organización Internacional para las Migraciones
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración



En la *Tabla 2*, cabe destacar que la mayoría de los métodos de regulación de fertilidad muestran diferencias significativas en cuanto a la proporción de inmigrantes y de chilenos, solo en el método de control Hormonal Oral Progestágeno P1010202 (7.77% población inmigrante y 7.98% población chilena) no se muestran diferencias significativas.

También es posible observar que el método de regulación más utilizado en la población inmigrante es el Hormonal inyectable combinado (23.05%) seguido del Hormonal inyectable progestágeno (20.05%) y por el Hormonal Oral Combinado (18.51%), mientras que en la población chilena el más frecuente es el Hormonal Oral Combinado (29.04%), seguido por el Dispositivo Intrauterino (23.80%) y por el Hormonal inyectable combinado (14.69%). Este último el más utilizado por la población inmigrante.

Considerando las diferencias observadas a nivel país, se realizó este mismo análisis para cada una de las regiones. Las tablas del Anexo 1.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y chilena controlada en cada uno de los métodos de regulación de fertilidad. Las tablas del Anexo 2.1 muestran la distribución para cada uno de los 29 servicios de salud de Chile de la población inmigrante y chilena controlada en cada uno de los métodos de regulación de fertilidad.



Sección B: Gestantes en control con riesgo psicosocial

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, corresponde a las gestantes que han sido controladas por su embarazo, control realizado por médico gineco-obstetra o matrona, y que han sido evaluadas con aplicación de la Pauta de Evaluación Psicosocial Abreviada, según la norma, con obtención de resultado con o sin riesgo psicosocial.

Las gestantes controladas se muestran según grupo de edad: P1020100 (Menos de 15 años), P1020200 (15 a 19 años), P1040501 (20 a 24 años), P1060100 (25 a 29 años), P1060101 (30 a 34 años), P1060102 (35 a 39 años), P1060103 (40 a 44 años), P1060104 (45 a 49 años) y P1060105 (50 a 54 años).

La mayor concentración gestantes inmigrantes en control con riesgo psicosocial se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 56.60% (2714). La segunda región con más atenciones concentra un 14.85% (712) y corresponde a la Región 2, seguida muy de cerca por la Región 1 con una concentración del 14.43% (692) del total.

Tabla 4. Distribución de Gestantes Inmigrantes en Control con Riesgo Psicosocial. 2015.

| Región | Total Inmigrantes | % Inmigrantes |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 692 | 14,43% |
| 2 | 712 | 14,85% |
| 3 | 138 | 2,88% |
| 4 | 85 | 1,77% |
| 5 | 85 | 1,77% |
| 6 | 21 | 0,44% |
| 7 | 20 | 0,42% |
| 8 | 25 | 0,52% |
| 9 | 18 | 0,38% |
| 10 | 15 | 0,31% |
| 11 | 10 | 0,21% |
| 12 | 26 | 0,54% |
| 13 | 2714 | 56,60% |
| 14 | 2 | 0,04% |
| 15 | 232 | 4,84% |
| Total Inmigrantes | 4795 | 100% |

Elaboración propia.

Tabla 5. Población de gestantes inmigrantes y chilenos con riesgo psicosocial, según Rango etario, total país, año 2015.

| Grupos de edad | Población Inmigrantes | % Inmigrantes | Población Chilena | % Chilenos | Total General | p-value |
|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------|
| Menos de 15 años | 10 | 0,21% | 518 | 0,57% | 528 | 0.0011 |
| 15 a 19 años | 398 | 8,30% | 12668 | 13,87% | 13066 | 0.0000 |
| 20 a 24 años | 1258 | 26,24% | 24611 | 26,94% | 25869 | 0.2825 |
| 25 a 29 años | 1365 | 28,47% | 24334 | 26,64% | 25699 | 0.0053 |
| 30 a 34 años | 1055 | 22,00% | 17126 | 18,75% | 18181 | 0.0000 |
| 35 a 39 años | 576 | 12,01% | 9236 | 10,11% | 9812 | 0.0000 |
| 40 a 44 años | 127 | 2,65% | 2732 | 2,99% | 2859 | 0.1740 |
| 45 a 49 años | 6 | 0,13% | 123 | 0,13% | 129 | 0.8607 |
| 50 a 54 años | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | NA |
| Total general | 4795 | | 91349 | | 96144 | |

Elaboración propia.

En la *Tabla 5*, cabe destacar que la mayoría de las gestantes muestran diferencias significativas en cuanto a la proporción de inmigrantes y de chilenos, salvo en las gestantes con edades comprendidas entre los 20 a 24 años, de 40 a 44 y de 45 a 49 años. En migrantes se observa menos embarazo en 15-19 años que chilenas en riesgo psicosocial (8% versus 13%).

También es posible observar que la mayor cantidad (28.47%) de gestantes inmigrantes con riesgo social, tienen entre 25 a 29 años, seguidas por aquellas que tienen entre 20 a 24 años (26.24%) y por las que tienen entre 30 a 34 años (22.00%), mientras que en la población chilena la mayor cantidad de gestantes con riesgo social se encuentra en casi la misma proporción (26.24%) tanto para aquellas mujeres que tienen entre 20 a 24, como en aquellas que tienen entre 25 a 29 años.

Considerando las diferencias observadas a nivel país, se realizó este mismo análisis para cada una de las regiones. Las tablas del Anexo 3.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población embarazada inmigrante y chilena con riesgo social. Las tablas del Anexo 4.1 muestran la distribución para cada uno de los 29 servicios de salud de Chile de la población embarazada inmigrante y chilena con riesgo social.

P2: Programa de Salud del Niño

El programa Salud del Niño, está compuesto por 8 secciones, distribuidas según las siguientes prestaciones:

Sección A: Población en control según estado nutricional

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P2060000 | Población en control según estado nutricional-total de niños en control |
| P2070101 | Población en control según estado nutricional - indicador peso/edad (- 1 d.s.) |
| P2070102 | Población en control según estado nutricional - indicador peso/edad (- 2 d.s.) |
| P2070201 | Población en control según estado nutricional - indicador peso/talla (+ 2 d.s.) |
| P2070202 | Población en control según estado nutricional - indicador peso/talla (+ 1 d.s.) |
| P2070301 | Población en control según estado nutricional - indicador peso/talla (-1 d.s.) |
| P2070302 | Población en control según estado nutricional - indicador peso/talla (- 2 d.s.) |
| P2070401 | Población en control según estado nutricional - indicador talla/edad (- 1 d.s.) |
| P2070402 | Población en control según estado nutricional - indicador talla/edad (- 2 d.s.) |
| P2070501 | Población en control según estado nutricional -diagnóstico nutricional integrado riesgo |

| | |
|-----------------|--|
| P2070502 | Población en control según estado nutricional -diagnóstico nutricional integrado desnutrido |
| P2070503 | Población en control según estado nutricional -diagnóstico nutricional integrado sobrepeso |
| P2070504 | Población en control según estado nutricional -diagnóstico nutricional integrado obeso |
| P2070505 | Población en control según estado nutricional -diagnóstico nutricional integrado normal |
| P2070506 | Población en control según estado nutricional -diagnóstico nutricional desnutrición secundaria |

Sección B: Población en control según resultado de pauta de observación de la relación vincular

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P2200100 | Población en control según resultado pauta de observación relación vincular – apego seguro 1 mes a 5 meses |
| P2200200 | Población en control según resultado pauta de observación relación vincular – apego seguro 12 a 23 meses |
| P2200300 | Población en control según resultado pauta de observación relación vincular – apego evitante 1 mes a 5 meses |
| P2200400 | Población en control según resultado pauta de observación relación vincular – apego evitante 12 a 23 meses |
| P2200500 | Población en control según resultado pauta de observación relación vincular – apego ambivalente 1 mes a 5 meses |
| P2200600 | Población en control según resultado pauta de observación relación vincular – apego ambivalente 12 a 23 meses |

Sección C: Población en control según resultado de evaluación del desarrollo psicomotor

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P2100200 | Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - riesgo menor de 12 meses |
| P2300100 | Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - riesgo menor de 12 a 17 meses |
| P2300200 | Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - riesgo 18 a 23 meses |
| P2100400 | Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - riesgo 24 a 47 meses |
| P2100500 | Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - riesgo 48 a 59 meses |
| P2100600 | Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - retraso menor de 12 meses |
| P2300300 | Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - retraso 12 a 17 meses |
| P2300400 | Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - retraso 18 a 23 meses |
| P2200900 | Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - retraso 24 a 47 meses |
| P2300000 | Población en control según resultado evaluación desarrollo psicomotor - retraso 48 a 59 meses |

Sección D: Población menor de 1 año en control, según score riesgo en ira y visita domiciliaria integral en el semestre

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P2090300 | Población menor de 1 año en control, según score riesgo en ira y visita domiciliaria integral en el semestre - leve |

| | |
|-----------------|---|
| P2090400 | Población menor de 1 año en control, según score riesgo en ira y visita domiciliaria integral en el semestre - moderado |
| P2100100 | Población menor de 1 año en control, según score riesgo en ira y visita domiciliaria integral en el semestre - grave |

Sección E: Población en control en el semestre con consulta nutricional, según estrategia

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P2200700 | Población en control en el semestre con consulta nutricional, según estrategia - al control del 5to mes |
| P2200800 | Población en control en el semestre con consulta nutricional, según estrategia - al control de los 3 años y 6 meses |

Sección F: Población inasistente a control del niño sano (al corte)

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P2300410 | Población inasistente a control del niño sano (al corte) - menor de 6 meses |
| P2300420 | Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 12 a 17 meses |
| P2300460 | Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 12 a 17 meses |
| P2300470 | Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 18 a 23 meses |
| P2300480 | Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 24 a 35 meses |
| P2300490 | Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 26 a 27 meses |
| P2300500 | Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 48 a 59 meses |
| P2300510 | Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 60 a 71 meses |
| P2300520 | Población inasistente a control del niño sano (al corte) - 6 a 9 años |

Sección G: Población infantil según diagnóstico de presión arterial (incluida en sección A)

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P2300530 | Población infantil según diagnóstico de presión arterial-normal (PA menor a percentil 90) |
| P2300540 | Población infantil según diagnóstico de presión arterial-pre-hipertensión (PA entre percentil 90 al 95) |
| P2300550 | Población infantil según diagnóstico de presión arterial-etapa 1 (PA entre percentil 95 al 99) |
| P2300560 | Población infantil según diagnóstico de presión arterial-etapa 2 (PA mayor al percentil 99) |

Sección H: Población infantil eutrófica, según riesgo de malnutrición por exceso (Incluida en sección A)

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P2300570 | Población infantil eutrófica, según riesgo de malnutrición por exceso -sin riesgo |
| P2300580 | Población infantil eutrófica, según riesgo de malnutrición por exceso-con riesgo |

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos relativos a población inmigrante solo para la sección A.



Sección A: Población en control según estado nutricional

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, y para la cual existe información relativa a la población inmigrante, corresponde a la población infantil de niños (as) menores de 9 años que se encuentran bajo control en establecimientos con nivel primario de atención, y que han sido evaluados según su estado nutricional, de acuerdo a la norma vigente y los indicadores peso/edad, peso/talla, talla/edad, por desviaciones estándar y diagnóstico de Estado Nutricional Integrado: normal, riesgo de desnutrir, desnutrido, sobrepeso, obeso y desnutridos secundarios.

La clasificación del Diagnóstico Nutricional Integrado para niños(as) de 6 a 9 años es bajo peso, riesgo de obesidad, obeso y normal.

La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en este programa se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 63.30% (2.035). La segunda región con más atenciones concentra un 16.27% (523) y corresponde a la Región 1, seguida de la región 2 con una concentración de un 6.66% (214), del total de atenciones de inmigrantes para este programa.

Tabla 7. Distribución de población inmigrante atendida en el Programa de Salud del Niño. 2015

| Región | Hombres Inmigrantes | % | Mujeres Inmigrantes | % | Total Inmigrantes | % Inmigrantes |
|------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 1 | 268 | 51,24% | 255 | 48,76% | 523 | 16,27% |
| 2 | 104 | 48,60% | 110 | 51,40% | 214 | 6,66% |
| 3 | 84 | 46,41% | 97 | 53,59% | 181 | 5,63% |
| 4 | 28 | 57,14% | 21 | 42,86% | 49 | 1,52% |
| 5 | 17 | 48,57% | 18 | 51,43% | 35 | 1,09% |
| 6 | 16 | 76,19% | 5 | 23,81% | 21 | 0,65% |
| 7 | 4 | 36,36% | 7 | 63,64% | 11 | 0,34% |
| 8 | 12 | 54,55% | 10 | 45,45% | 22 | 0,68% |
| 9 | 8 | 18,18% | 36 | 81,82% | 44 | 1,37% |
| 10 | 17 | 51,52% | 16 | 48,48% | 33 | 1,03% |
| 11 | 5 | 55,56% | 4 | 44,44% | 9 | 0,28% |
| 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | 1010 | 49,63% | 1025 | 50,37% | 2035 | 63,30% |
| 14 | 6 | 75,00% | 2 | 25,00% | 8 | 0,25% |
| 15 | 21 | 70,00% | 9 | 30,00% | 30 | 0,93% |
| Total Inmigrantes | 1600 | 49,77% | 1615 | 50,23% | 3215 | 100,00% |

Elaboración propia.

Tabla 8. Población de hombres inmigrantes y de chilenos en control según estado nutricional, total país, año 2015.

| | Indicador Nutricional y Parámetro de Medición | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de Hombres | p-value |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Diagnóstico Nutricional Integrado | Riesgo/Bajo peso | 53 | 3,31% | 15461 | 2,73% | 15514 | 0.1564 |
| | Desnutrido | 7 | 0,44% | 1929 | 0,34% | 1936 | 0.5090 |
| | Sobre peso/Riesgo obesidad | 342 | 21,38% | 127041 | 22,46% | 127383 | 0.2978 |
| | Obeso | 137 | 8,56% | 71600 | 12,66% | 71737 | 0.0000 |
| | Normal | 978 | 61,13% | 344465 | 60,91% | 345443 | 0.8583 |
| | Desnutrición secundaria | 7 | 0,44% | 125 | 0,02% | 132 | 0.0000 |
| Indicador peso/edad | -1 D.S | 80 | 5,00% | 21523 | 3,81% | 21603 | 0.0127 |
| | -2 D.S. | 13 | 0,81% | 2803 | 0,50% | 2816 | 0.0717 |
| Indicador peso/talla | +2 D.S | 95 | 5,94% | 55842 | 9,87% | 55937 | 0.0000 |
| | +1 D.S. | 250 | 15,63% | 112388 | 19,87% | 112638 | 0.0000 |
| | -1 D.S. | 55 | 3,44% | 13299 | 2,35% | 13354 | 0.0042 |
| | -2 D.S. | 17 | 1,06% | 1722 | 0,30% | 1739 | 0.0000 |
| Indicador talla/edad | -1 D.S. | 180 | 11,25% | 55076 | 9,74% | 55256 | 0.0417 |
| | -2 D.S. | 26 | 1,63% | 10106 | 1,79% | 10132 | 0.6254 |
| Total de niños en control | | 1600 | 95,25% | 565560 | 99,13% | 567160 | |

Elaboración propia.



En la *Tabla 8*, cabe destacar que la mayoría de los niños a los que se ha efectuado un Diagnóstico Nutricional Integrado, no muestran diferencias significativas en cuanto a la proporción de inmigrantes y de chilenos, solo aquellos niños diagnosticados como obesos y aquellos con Desnutrición secundaria, muestran diferencias significativas.

También es posible observar que la mayor parte de los niños inmigrantes (61.13%) tiene un Diagnóstico Nutricional Integrado de Normal, seguido de aquellos que son diagnosticados Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad (21.38%). En la población chilena, el diagnóstico es bastante similar, puesto que la mayoría de los niños (60.91%) son diagnosticados como Normal, seguido de aquellos niños que son diagnosticados con Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad (22.46%).

Es importante mencionar que el total de niños en control (tanto chilenos, como inmigrantes), debe corresponder a la suma de todos los diagnósticos nutricionales, sin embargo, el total de casos de niños inmigrantes con diagnóstico es del 95.25%, faltando un 4.75% de niños; en el caso de los niños chilenos el 99.13% tiene un diagnóstico, faltando un 0.87%.

Tabla 9. Población de mujeres inmigrantes y de chilenas en control según estado nutricional, total país, año 2015.

| | Indicador Nutricional y Parámetro de Medición | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
|---|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Diagnóstico Nutricional Integrado | Riesgo/Bajo peso | 49 | 3,03% | 13056 | 2,39% | 13105 | 0.0882 |
| | Desnutrido | 3 | 0,19% | 1425 | 0,26% | 1428 | 0.5567 |
| | Sobre peso/Riesgo obesidad | 277 | 17,15% | 123924 | 22,64% | 124201 | 0.0000 |
| | Obeso | 144 | 8,92% | 64924 | 11,86% | 65068 | 0.0003 |
| | Normal | 974 | 60,31% | 338980 | 61,94% | 339954 | 0.1787 |
| | Desnutrición secundaria | 14 | 0,87% | 115 | 0,02% | 129 | 0.0000 |
| Indicador peso/edad | -1 D.S | 87 | 5,39% | 17474 | 3,19% | 17561 | 0.0000 |
| | -2 D.S. | 8 | 0,50% | 2087 | 0,38% | 2095 | 0.4580 |
| Indicador peso/talla | +2 D.S | 91 | 5,63% | 50142 | 9,16% | 50233 | 0.0000 |
| | +1 D.S. | 235 | 14,55% | 109086 | 19,93% | 109321 | 0.0000 |
| | -1 D.S. | 57 | 3,53% | 11090 | 2,03% | 11147 | 0.0000 |
| | -2 D.S. | 10 | 0,62% | 1311 | 0,24% | 1321 | 0.0019 |
| Indicador talla/edad | -1 D.S. | 197 | 12,20% | 49696 | 9,08% | 49893 | 0.0000 |
| | -2 D.S. | 26 | 1,61% | 7701 | 1,41% | 7727 | 0.4897 |
| | Total de niños en control | 1615 | 90,46% | 547301 | 99,11% | 548916 | |

Elaboración propia.



En la *Tabla 9*, se puede visualizar que de las niñas a los que se ha efectuado un Diagnóstico Nutricional Integrado, muestran diferencias significativas en cuanto a la proporción de inmigrantes y de chilenas en aquellas diagnosticadas con Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad, Obesas y con Desnutrición secundaria. Los restantes diagnósticos, no muestran diferencias significativas.

También es posible observar que la mayor parte de las niñas inmigrantes (60,31%) tiene un Diagnóstico Nutricional Integrado de Normal, seguido de aquellas que son diagnosticadas con Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad (17,15%). En la población chilena, el diagnóstico es bastante similar, puesto que la mayoría de las niñas (61,94%) son diagnosticadas como Normal, seguido de aquellas niñas que son diagnosticadas con Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad (22,64%).

Es importante mencionar que el total de niñas en control (tanto chilenas, como inmigrantes) debe corresponder a la suma de todos los diagnósticos nutricionales, sin embargo, el total de casos de niñas inmigrantes con diagnóstico es del 90,46%, faltando un 9,54% de niñas; en el caso de las niñas chilenas el 99,11% tiene un diagnóstico, faltando un 0.89%.

Considerando las diferencias observadas a nivel país, se realizó este mismo análisis para cada una de las regiones.

Las tablas del Anexo 5.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y chilena con un Diagnóstico Nutricional Integrado.

P3: Control de otros Programas

El control de otros programas, está compuesto por 4 secciones, distribuidas según las siguientes prestaciones:

Sección A: Existencia de Población en control

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P3160950 | Existencia de población en control - síndrome bronquial obstructivo recurrente (SBOR)-leve |
| P3160960 | Existencia de población en control - síndrome bronquial obstructivo recurrente (SBOR)-moderado |
| P3160970 | Existencia de población en control - síndrome bronquial obstructivo recurrente (SBOR)-severo |
| P3160980 | Existencia de población en control - asma bronquial-leve |
| P3160990 | Existencia de población en control - asma bronquial-moderado |
| P3161000 | Existencia de población en control - asma bronquial-severo |
| P3161010 | Existencia de población en control - enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)- tipo A |
| P3161020 | Existencia de población en control - enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)-tipo B |
| P3161030 | Existencia de población en control - otras respiratorias crónicas |
| P3120500 | Existencia de población en control - oxígeno dependiente |
| P3120600 | Existencia de población en control - fibrosis quística |
| P3120700 | Existencia de población en control - epilepsia |
| P3140200 | Existencia de población en control - enfermedad de Parkinson |

| | |
|-----------------|--|
| P3140300 | Existencia de población en control - artrosis de cadera y rodilla |
| P3120800 | Existencia de población en control - alivio del dolor |
| P3161040 | Existencia de población en control - hipotiroidismo |
| P3160910 | Existencia de población en control - dependencia leve |
| P3160920 | Existencia de población en control - dependencia moderada |
| P3130200 | Existencia de población en control - dependencia severa oncológica |
| P3140400 | Existencia de población en control - dependencia severa no oncológica |
| P3130201 | Existencia de población en control - dependencia severa con escaras |
| P3160800 | Existencia de población en control - programa atención domiciliaria por dependencia severa-total personas |
| P3160900 | Existencia de población en control - programa atención domiciliaria por dependencia severa-total de personas con escaras |
| P3160940 | Existencia de población en control - programa atención domiciliaria por dependencia severa-total de personas con cuidador que recibe apoyo monetario |

Sección B: Cuidadores de pacientes con dependencia severa

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P5300600 | Cuidadores de pacientes con dependencia severa-número de cuidadores |

Sección C: Población en control en programa de rehabilitación pulmonar en sala ira-era

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P3160930 | Población en control en programa de rehabilitación pulmonar en sala ira-era - rehabilitación pulmonar |

Sección D: Nivel de control de población respiratoria crónica

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P3161041 | Nivel de control de población respiratoria crónica asma bronquial-controlado |
| P3161042 | Nivel de control de población respiratoria crónica asma bronquial-parcialmente controlado |
| P3161043 | Nivel de control de población respiratoria crónica asma bronquial-no controlado |
| P3161044 | Nivel de control de población respiratoria crónica asma bronquial-No evaluada |
| P3161045 | Nivel de control de población respiratoria crónica enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)-logra control adecuado |
| P3161046 | Nivel de control de población respiratoria crónica enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)-no logra control adecuado |
| P3161047 | Nivel de control de población respiratoria crónica enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)-No evaluada |

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos relativos a población inmigrante solo para la sección A.

Sección A: Existencia de población en control

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, corresponde al número total de personas que se encuentran bajo control en el establecimiento por los distintos programas de salud a la fecha de corte. Se debe considerar el registro por patologías y/o condiciones, es decir, si un paciente padece asma bronquial y artrosis de cadera y rodilla, se debe registrar ambas patologías.

La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en estos programas se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 34.21% (2062). La segunda región con más atenciones concentra un 17.83% (1075) y corresponde a la Región XII, seguida de la región IX con una concentración de un 12.49% (753), del total de prestaciones utilizadas por la población inmigrante.

Tabla 11. Distribución de población inmigrante de Otros programas. 2015

| Región | Hombres Inmigrantes | % | Mujeres Inmigrantes | % | Total Inmigrantes | % Inmigrantes |
|--------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---------------|
| 1 | 20 | 1,00% | 148 | 3,68% | 168 | 2,79% |
| 2 | 8 | 0,40% | 15 | 0,37% | 23 | 0,38% |
| 3 | 1 | 0,05% | 14 | 0,35% | 15 | 0,25% |
| 4 | 57 | 2,84% | 82 | 2,04% | 139 | 2,31% |
| 5 | 18 | 0,90% | 6 | 0,15% | 24 | 0,40% |
| 6 | 5 | 0,25% | 4 | 0,10% | 9 | 0,15% |
| 7 | 212 | 10,56% | 306 | 7,61% | 518 | 8,59% |
| 8 | 267 | 13,30% | 339 | 8,43% | 606 | 10,05% |
| 9 | 304 | 15,15% | 449 | 11,17% | 753 | 12,49% |
| 10 | 119 | 5,93% | 298 | 7,41% | 417 | 6,92% |
| 11 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | 314 | 15,65% | 761 | 18,93% | 1075 | 17,83% |
| 13 | 598 | 29,80% | 1464 | 36,41% | 2062 | 34,21% |
| 14 | 16 | 0,80% | 30 | 0,75% | 46 | 0,76% |
| 15 | 68 | 3,39% | 105 | 2,61% | 173 | 2,87% |
| Total Inmigrantes | 2007 | | 4021 | | 6028 | |

Elaboración propia.

Tabla 11.1 Población de hombres inmigrantes y de chilenos en control de otros programas, Total país, año 2015.

| | Programa | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente (SBOR) | Leve | 64 | 3,40% | 11620 | 4,01% | 11684 | 0.1836 |
| | Moderado | 47 | 2,50% | 18014 | 6,21% | 18061 | 0.0000 |
| | Severo | 0 | 0,00% | 761 | 0,26% | 761 | NA |
| Asma Bronquial | Leve | 456 | 24,24% | 43503 | 15,00% | 43959 | 0.0000 |
| | Moderado | 158 | 8,40% | 39241 | 13,53% | 39399 | 0.0000 |
| | Severo | 23 | 1,22% | 4071 | 1,40% | 4094 | 0.5069 |
| Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) | Tipo A | 407 | 21,64% | 34114 | 11,76% | 34521 | 0.0000 |
| | Tipo B | 67 | 3,56% | 7482 | 2,58% | 7549 | 0.0074 |
| | Otras Respiratorias Crónicas | 116 | 6,17% | 11284 | 3,89% | 11400 | 0.0000 |
| | Oxígeno Dependiente | 33 | 1,75% | 2276 | 0,78% | 2309 | 0.0000 |
| | Fibrosis Quística | 0 | 0,00% | 261 | 0,09% | 261 | NA |
| | Epilepsia | 96 | 5,10% | 24255 | 8,36% | 24351 | 0.0000 |
| | Enfermedad de Parkinson | 18 | 0,96% | 8067 | 2,78% | 8085 | 0.0000 |
| | Artrosis de Cadera y Rodilla | 354 | 18,82% | 53923 | 18,59% | 54277 | 0.7958 |
| | Alivio del Dolor | 5 | 0,27% | 5003 | 1,72% | 5008 | 0.0000 |
| | Hipotiroidismo | 37 | 1,97% | 26237 | 9,04% | 26274 | 0.0000 |
| | Total | 1881 | | 290112 | | 291993 | |
| | Tipo de Dependencia | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
| | Dependencia Leve | 11 | 13,58% | 10658 | 31,28% | 10669 | 0.0006 |
| | Dependencia Moderada | 18 | 22,22% | 5283 | 15,50% | 5301 | 0.0954 |

| | Programa | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|--------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Dependencia Severa | Oncológica | 4 | 4,94% | 1826 | 5,36% | 1830 | 0.8666 |
| | No oncológica | 48 | 59,26% | 16307 | 47,86% | 16355 | 0.0402 |
| | Con escaras | 3 | 5,77% | 1644 | | 1647 | 0.4081 |
| | Total | 81 | | 34074 | | 15970 | |
| | Atención Domiciliaria por Dependencia Severa | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
| | Total Personas | 20 | | 15994 | | 16014 | |
| | Total personas con Escaras | 2 | 10,00% | 1510 | 9,44% | 1512 | 0.9319 |
| | Total Personas con cuidador que recibe apoyo monetario | 20 | 100,00% | 8848 | 55,32% | 8868 | 0.0001 |

Elaboración propia.

La patología más frecuente en los hombres inmigrantes a nivel país, es el Asma Bronquial Leve (24.24%), seguida de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Tipo A (21.64%) y de la Artrosis de Cadera y Rodilla (18.82%).

En la mayoría de las patologías se muestran diferencias significativas con respecto a la proporción de hombres chilenos, salvo en el Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente Leve, el Asma Bronquial Severo, la Fibrosis Quística y la Artrosis de Cadera y Rodilla. Con respecto a la distribución de aquellos hombres con algún tipo de dependencia según el índice de Barthel, la Dependencia Severa No oncológica es la más frecuente en hombres inmigrantes (59.26%) y también es la más frecuente en los hombres chilenos (47.86%). Sin embargo, la diferencia entre estas proporciones es estadísticamente significativa, al igual que la diferencia entre las proporciones de aquellos hombres que padecen una Dependencia Leve.

Para aquellas personas beneficiadas con el Programa de Atención Domiciliaria por Dependencia Severa, se observan diferencias significativas en la proporción de Personas con cuidador que reciben apoyo monetario.

Tabla 11.2 Población de mujeres inmigrantes y de chilenas en control de otros programas. Total país, año 2015.

| | | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente (SBOR) | Leve | 50 | 1,29% | 8536 | 1,36% | 8586 | 0.6886 |
| | Moderado | 35 | 0,90% | 12946 | 2,07% | 12981 | 0.0000 |
| | Severo | 0 | 0,00% | 461 | 0,07% | 461 | NA |
| Asma Bronquial | Leve | 1001 | 25,80% | 78758 | 12,58% | 79759 | 0.0000 |
| | Moderado | 382 | 9,85% | 57694 | 9,22% | 58076 | 0.1765 |
| | Severo | 48 | 1,24% | 7807 | 1,25% | 7855 | 0.9557 |
| Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) | Tipo A | 517 | 13,32% | 43409 | 6,93% | 43926 | 0.0000 |
| | Tipo B | 54 | 1,39% | 7413 | 1,18% | 7467 | 0.2335 |
| | Otras Respiratorias Crónicas | 99 | 2,55% | 18578 | 2,97% | 18677 | 0.1278 |
| | Oxígeno Dependiente | 27 | 0,70% | 2913 | 0,47% | 2940 | 0.0357 |
| | Fibrosis Quística | 1 | 0,03% | 353 | 0,06% | 354 | 0.4225 |
| | Epilepsia | 70 | 1,80% | 24657 | 3,94% | 24727 | 0.0000 |
| | Enfermedad de Parkinson | 30 | 0,77% | 7988 | 1,28% | 8018 | 0.0054 |
| | Artrosis de Cadera y Rodilla | 1188 | 30,62% | 169092 | 27,01% | 170280 | 0.0000 |
| | Alivio del Dolor | 0 | 0,00% | 6275 | 1,00% | 6275 | NA |
| | Hipotiroidismo | 378 | 9,74% | 179163 | 28,62% | 179541 | 0.0000 |
| | Total | 3880 | | 626043 | | 629923 | |
| | Tipo de Dependencia | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
| | Dependencia Leve | 11 | 11,96% | 19585 | 34,00% | 19596 | 0.0000 |
| | Dependencia Moderada | 38 | 41,30% | 9541 | 16,56% | 9579 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Dependencia Severa | Oncológica | 1 | 1,09% | 2052 | 3,56% | 2053 | 0.2003 |
| | No oncológica | 42 | 45,65% | 26429 | 45,88% | 26471 | 0.9653 |
| | Con escaras | 2 | 4,65% | 2521 | 8,85% | 2523 | 0.3324 |
| | Total | 92 | | 57607 | | 29175 | |
| | Atención Domiciliaria por Dependencia Severa | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
| | Total Personas | 17 | | 24992 | | 25009 | 0.0000 |
| | Total personas con Escaras | 3 | 17,65% | 2364 | 9,46% | 2367 | 0.2489 |
| | Total Personas con cuidador que recibe apoyo monetario | 27 | 158,82% | 11964 | 47,87% | 11991 | 0.0000 |

Elaboración propia.

La patología más frecuente en las mujeres inmigrantes a nivel país, es la Artrosis de Cadera y Rodilla (30.62%), seguida del Asma Bronquial Leve (25.80%) y de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Tipo A (13.32%).

En la mayoría de las patologías se muestran diferencias significativas entre la proporción de mujeres inmigrantes y la proporción de mujeres chilenas, salvo en el Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente Leve y Severo, el Asma Bronquial Moderado y Severo, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Tipo B, en Otras Respiratorias Crónicas, y la Fibrosis Quística.

Con respecto a la distribución de aquellas mujeres con algún tipo de dependencia según el índice de Barthel, la Dependencia Severa No oncológica es la más frecuente en mujeres inmigrantes (45.65%) y también es la más frecuente en las mujeres chilenas (45.86%). La dependencia Leve y la Moderada, presentan diferencias significativas en las proporciones de mujeres inmigrantes y mujeres chilenas.

Los datos reportados para el Programa de Atención Domiciliaria por Dependencia Severa, muestran errores en sus registros, por lo que no consideran para análisis. Las tablas del Anexo 6.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y chilena en control de otros programas.

P4: Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)

El programa de Salud Cardiovascular, está compuesto por 3 secciones, distribuidas según las siguientes prestaciones:

Sección A: Programa Salud Cardiovascular (PSCV)

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P4150100 | Programa salud cardiovascular. PSCV - número de personas en PSCV |
| P4190100 | Programa salud cardiovascular. PSCV - clasificación del riesgo cardiovascular - bajo |
| P4150703 | Programa salud cardiovascular. PSCV- clasificación del riesgo cardiovascular-moderado |
| P4150801 | Programa salud cardiovascular. PSCV - clasificación del riesgo cardiovascular - alto |
| P4150601 | Programa salud cardiovascular. PSCV - personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) - hipertensos |
| P4150602 | Programa salud cardiovascular. PSCV - personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) - diabéticos |
| P4150603 | Programa salud cardiovascular. PSCV - personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) - dislipidémicos |
| P4150701 | Programa salud cardiovascular. PSCV - personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) - tabaquismo |
| P4190900 | Programa salud cardiovascular. PSCV - personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) - antecedentes de infarto (IAM) |
| P4190910 | Programa salud cardiovascular. PSCV - personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) - antecedentes de enf. Cerebro vascular |

| | |
|-----------------|---|
| P4190800 | Programa salud cardiovascular. PSCV - detección y prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC) sin enfermedad renal /serc |
| P4190801 | Programa salud cardiovascular. PSCV - detección y prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC) etapa 1 y etapa 2 (vfg \geq 60 ml/min) |
| P4190810 | Programa salud cardiovascular. PSCV - detección y prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC) etapa 3a (vfg \geq 45 a 59 ml/min) |
| P4190811 | Programa salud cardiovascular. PSCV - detección y prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica (ER) etapa 3a (vfg \geq 30 a 44 ml/min) |
| P4190803 | Programa salud cardiovascular. PSCV - detección y prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC) etapa 4 (vfg \geq 15 a 29 ml/min) |
| P4190804 | Programa salud cardiovascular. PSCV - detección y prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC) etapa 5 (vfg $<$ 15 ml/min) |

Sección B: Metas de compensación

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P4180200 | Metas de compensación, personas bajo control por hipertensión PA $<$ 140/90 mmhg |
| P4180300 | Metas de compensación, personas bajo control por diabetes mellitus hba1c $<$ 7% |
| P4190920 | Metas de compensación, personas bajo control por diabetes mellitus hba1c $<$ 7% - PA $<$ 140/90 mmhg y colesterol ldl $<$ 100mg/dl |
| P4180500 | Metas de compensación, personas bajo control en riesgo cv no diabéticas alto con col. Ldl $<$ 100 mg/dl |

| | |
|-----------------|--|
| P4190930 | Metas de compensación, personas bajo control con antecedentes enf. Cerebrovascular (ecv)-en tratamiento con ácido acetilsalicílico |
| P4190940 | Metas de compensación, personas bajo control con antecedentes enf. Cerebrovascular (ecv)-en tratamiento con estatina |

Sección C: Variables de seguimiento del PSCV al corte

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P4190805 | Variables de seguimiento del PSCV diabetes - con razón albúmina creatinina (rac),vigente |
| P4190806 | Variables de seguimiento del PSCV - con velocidad de filtración glomerular (vfg), vigente |
| P4190950 | Variables de seguimiento del PSCV - con fondo de ojo, vigente |
| P4180800 | Variables de seguimiento del PSCV - en tratamiento con insulina |
| P4190960 | Variables de seguimiento del PSCV - CON hba1c>= 9 % |
| P4190807 | Variables de seguimiento del PSCV - en tratamiento con ieca o ara ii. |
| P4190808 | Variables de seguimiento del PSCV - con un examen de colesterol ldl vigente. |
| P4190809 | Variables de seguimiento del PSCV - con "evaluación vigente del pie según pauta de estimación del riesgo de ulceración en personas con diabetes-riesgo bajo |
| P4170300 | Variables de seguimiento del PSCV - con "evaluación vigente del pie según pauta de estimación del riesgo de ulceración en personas con diabetes-riesgo moderado |
| P4190500 | Variables de seguimiento del PSCV - con "evaluación vigente del pie según pauta de estimación del riesgo de ulceración en personas con diabetes-riesgo alto |

| | |
|-----------------|---|
| P4190600 | Variables de seguimiento del PSCV - con "evaluación vigente del pie según pauta de estimación del riesgo de ulceración en personas con diabetes-riesgo máximo |
| P4190970 | Variables de seguimiento del PSCV - con úlceras activas de pie tratadas con curación- curación convencional |
| P4170500 | Variables de seguimiento del PSCV-con úlceras activas de pie tratadas con curación - curación avanzada |
| P4190980 | Variables de seguimiento del PSCV - pacientes diabéticos con evaluación, en los últimos 12 meses, de calidad registrada en qualidiab u otro sistema informático |
| P4190812 | Variables de seguimiento del PSCV hipertensión-con razón albúmina creatinina (rac),vigente |

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos relativos a población inmigrante solo para la sección A y B.

Sección A: Programa Salud Cardiovascular (PSCV)

En esta sección se registra el número de personas en control de PSCV, clasificados según riesgo cardiovascular (bajo, moderado, alto), según patología y factores de riesgo (hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, tabaquismo, antecedentes de infarto al miocardio (IAM), antecedentes de enfermedades cerebro vascular (AVC). Además, se registra el número de personas en PSCV que se les ha aplicado la pauta de detección de enfermedad renal crónica.

El “Número de personas en PSCV” representa la población total que se encuentra bajo control en el Programa en el establecimiento, dado que independiente de su problema de salud o condición, es clasificada según riesgo cardiovascular que puede ser bajo, moderado o alto. La mayor concentración de inmigrantes que se atiende en el Programa de Salud Cardiovascular se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 65.15% (2232). La segunda región con más atenciones concentra un 7.62% (261) y corresponde a la Región IX, seguida de la región III con una concentración de un 5.98% (205), del total de prestaciones utilizadas por la población inmigrante.

Tabla 13. Población de inmigrantes en control en el Programa de Salud Cardiovascular. Total país, año 2015.

| Región | Hombres Inmigrantes | % | Mujeres Inmigrantes | % | Total Inmigrantes | % Inmigrantes |
|--------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---------------|
| 1 | 20 | 1,62% | 66 | 3,01% | 86 | 2,51% |
| 2 | 6 | 0,49% | 27 | 1,23% | 33 | 0,96% |
| 3 | 70 | 5,69% | 135 | 6,15% | 205 | 5,98% |
| 4 | 11 | 0,89% | 13 | 0,59% | 24 | 0,70% |
| 5 | 31 | 2,52% | 63 | 2,87% | 94 | 2,74% |
| 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | 23 | 1,87% | 40 | 1,82% | 63 | 1,84% |
| 9 | 83 | 6,74% | 178 | 8,11% | 261 | 7,62% |
| 10 | 61 | 4,96% | 108 | 4,92% | 169 | 4,93% |
| 11 | 40 | 3,25% | 103 | 4,69% | 143 | 4,17% |
| 12 | 21 | 1,71% | 19 | 0,87% | 40 | 1,17% |
| 13 | 835 | 67,83% | 1397 | 63,64% | 2232 | 65,15% |
| 14 | 22 | 1,79% | 33 | 1,50% | 55 | 1,61% |
| 15 | 2 | 0,65% | 13 | 0,59% | 21 | 0,61% |
| Total Inmigrantes | 1231 | | 2195 | | 3426 | |

Elaboración propia.

Tabla 13.1 Población de hombres inmigrantes y de chilenos en el Programa de Salud Cardiovascular. Total país, año 2015.

| Concepto | | Total | % | Total | % | Total | p-value |
|--|---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------|---------|
| | | Hombres Inmigrantes | % Hombres Inmigrantes | Hombres Chilenos | % Hombres Chilenos | Hombres | |
| Personas en control PSCV | | 1231 | | 789084 | | 790315 | |
| Clasificación del riesgo cardiovascular | Bajo | 283 | 22,99% | 119538 | 15,15% | 119821 | 0.5434 |
| | Moderado | 458 | 37,21% | 268145 | 33,98% | 268603 | 0.9651 |
| | Alto | 490 | 39,81% | 399990 | 50,69% | 400480 | 0.1563 |
| Personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) | Hipertensos | 1255 | 101,95% | 653190 | 82,78% | 654445 | |
| | Diabéticos | 649 | 52,72% | 301313 | 38,19% | 301962 | 0.0652 |
| | Dislipidémicos | 811 | 65,88% | 331117 | 41,96% | 331928 | 0.0452 |
| | Tabaquismo ≥ 55 años | 249 | 20,23% | 68621 | 8,70% | 68870 | 0.0012 |
| | Antecedentes IAM | 70 | 5,69% | 32000 | 4,06% | 32070 | 0.9654 |
| | Antecedentes ECV | 90 | 7,31% | 38567 | 4,89% | 38657 | 0.8453 |
| Detección y prevención de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) | Sin enfermedad Renal | 1157 | 93,99% | 280494 | 35,55% | 281651 | 0.1452 |
| | Etapa G1 y G2 (VFG ≥ 60 ml/min) | 274 | 22,26% | 138316 | 17,53% | 138590 | 0.5214 |
| | Etapa G3a (VFG ≥45 a 59 ml/min) | 85 | 6,90% | 39086 | 4,95% | 39171 | 0.6254 |
| | Etapa G3b (VFG ≥45 a 59 ml/min) | 20 | 1,62% | 12537 | 1,59% | 12557 | 0.9198 |
| | Etapa G4 (VFG ≥30 a 44 ml/min) | 4 | 0,32% | 4675 | 0,59% | 4679 | 0.2215 |
| | Etapa G5 (VFG <15 ml/min) | 3 | 0,24% | 2606 | 0,33% | 2609 | 0.5968 |

*Posibles errores de registro de origen dan cuenta de valores superiores al 100%, esto ya fue documentado a DEIS previo a la entrega de este reporte. Elaboración propia.



Organización Internacional para las Migraciones
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración



La información mostrada en la tabla, corresponde a los hombres chilenos e inmigrantes en control en el programa de Salud Cardiovascular a nivel país.

Del total de 1231 hombres inmigrantes en este programa, la mayoría (39.81%) se clasifican riesgo cardiovascular alto. En el caso de hombres chilenos, la situación es bastante similar, puesto que la mayoría (50.69%) también se clasifican con riesgo cardiovascular alto. Sin embargo, la diferencia entre las proporciones de estas poblaciones es significativa.

Con respecto a las personas bajo control según patología y existencia de factores de riesgo, en el caso de los hombres inmigrantes, se puede observar que la mayoría (1255) son hipertensos (este número es llamativo, puesto que el total de inmigrantes en control es 1231. En los hombres chilenos, también la mayoría es hipertensa (82.78%).

En la detección y prevención de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), se puede identificar que la mayoría de los hombres inmigrantes (93.99%), no tienen enfermedad renal, mientras que, en la población de hombres chilenos, el 35.55% no muestra esta enfermedad. La diferencia de las proporciones de hombres inmigrantes y de chilenos con respecto a aquellos que no tienen esta enfermedad es significativa.

Tabla 13.2 Población de mujeres inmigrantes y de chilenas en el Programa de Salud Cardiovascular. Total país, año 2015.

| Concepto | | Total Mujeres Inmigrantes | % Mujeres Inmigrantes | Total Mujeres Chilenas | % Mujeres Chilenas | Total Mujeres | p-value |
|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Personas en control PSCV | | 2195 | | 1371404 | | 1373599 | |
| Clasificación del riesgo cardiovascular | Bajo | 574 | 26,15% | 256372 | 18,69% | 256946 | 0.0421 |
| | Moderado | 919 | 41,87% | 527998 | 38,50% | 528917 | 0.9524 |
| | Alto | 702 | 31,98% | 585696 | 42,71% | 586398 | 0.5214 |
| Personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) | Hipertensos | 2201 | 100,27% | 1120215 | 81,68% | 1122416 | |
| | Diabéticos | 1085 | 49,43% | 477248 | 34,80% | 478333 | 0.0621 |
| | Dislipidémicos | 1521 | 69,29% | 664450 | 48,45% | 665971 | 0.0451 |
| | Tabaquismo ≥ 55 años | 277 | 12,62% | 92220 | 6,72% | 92497 | 0.0965 |
| | Antecedentes IAM | 53 | 2,41% | 29373 | 2,14% | 29426 | 0.3778 |
| | Antecedentes ECV | 130 | 5,92% | 40327 | 2,94% | 40457 | 0.9632 |
| Detección y prevención de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) | Sin enfermedad Renal | 2054 | 93,58% | 481823 | 35,13% | 483877 | 0.0258 |
| | Etapa G1 y G2 (VFG ≥ 60 ml/min) | 405 | 18,45% | 236708 | 17,26% | 237113 | 0.1402 |
| | Etapa G3a (VFG ≥45 a 59 ml/min) | 95 | 4,33% | 73176 | 5,34% | 73271 | 0.0358 |
| | Etapa G3b (VFG ≥45 a 59 ml/min) | 36 | 1,64% | 25622 | 1,87% | 25658 | 0.4301 |
| | Etapa G4 (VFG ≥30 a 44 ml/min) | 12 | 0,55% | 8768 | 0,64% | 8780 | 0.5863 |
| | Etapa G5 (VFG <15 ml/min) | 11 | 0,50% | 3358 | 0,24% | 3369 | 0.0153 |

*Posibles errores de registro de origen dan cuenta de valores superiores al 100%, esto ya fue documentado a DEIS previo a la entrega de este reporte. Elaboración propia.



La información mostrada en la tabla, corresponde a mujeres chilenas e inmigrantes en control en el programa de Salud Cardiovascular a nivel país.

Del total de 2195 mujeres inmigrantes en este programa, la mayoría (41.87%) se clasifican con riesgo cardiovascular moderado. En el caso de mujeres chilenas, la mayoría (42.71%) se clasifican con riesgo cardiovascular alto. Para ambas clasificaciones la diferencia entre mujeres inmigrantes y chilenas es significativa.

Con respecto a las personas bajo control según patología y existencia de factores de riesgo, en el caso de las mujeres inmigrantes, se puede observar que la mayoría (2201) son hipertensas (este número es llamativo, puesto que el total de inmigrantes en control es 2195. En las mujeres chilenas, también la mayoría es hipertensa (81.68%).

En la detección y prevención de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), se puede identificar que la mayoría de las mujeres inmigrantes (93.58%), no tienen enfermedad renal, mientras que, en la población de mujeres chilenas, el 35.13% no muestra esta enfermedad. La diferencia de las proporciones de mujeres inmigrantes y de chilenas con respecto a aquellas que no tienen esta enfermedad es significativa.

Las tablas del Anexo 7.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y chilena en el Programa de Salud Cardiovascular.

Sección B: Metas de Compensación

En esta sección corresponde registrar el número de personas en control de PSCV, que tienen compensadas sus patologías.

El número de personas con Presión Arterial menor a 140/90 mmHg, están contenidas en el total de hipertensos, por lo tanto, debe ser menor o igual al total del número de personas con diagnóstico de Hipertensión.

El número de personas en control, con examen de Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) menor a 7% están contenidas en el total de diabéticos, por lo tanto, debe ser menor o igual al total del número de personas con diagnóstico Diabetes Mellitus.

El número de personas en control, con examen de Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) menor a 7% y presión arterial menor a 140/90 mmHg y Colesterol LDL menor a 100 mg/dL están contenidas en el total de diabéticos, por lo tanto, debe ser menor o igual al total del número de personas con diagnóstico Diabetes Mellitus.

El número de personas en control, no diabéticas, con riesgo cardiovascular Alto con colesterol LDL menor a 100 mg/dl., debe ser menor o igual al número total de personas con riesgo cardiovascular Alto de la sección A.

El número de personas en control, con antecedentes de enfermedad cardiovascular en tratamiento con ácido acetilsalicílico, debe ser menor o igual al número total de personas con antecedentes de infarto (IAM) y enfermedad cerebro vascular (AVC) de la sección A.

El número de personas en control, con antecedentes de enfermedad cardiovascular en tratamiento con estatinas, debe ser menor o igual al número total de personas con antecedentes de infarto (IAM) y enfermedad cerebro vascular (AVC) de la sección A.

Tabla 15.1 Población de hombres inmigrantes y de chilenos en el Programa de Salud Cardiovascular con patologías compensadas. Total País, año 2015.

| Concepto | | Total Hombres Inmigrantes Metas | Total Hombres Inmigrantes | % Hombres Inmigrantes Metas | Total Hombres chilenos Metas | Total Hombres chilenos | % Hombres chilenos Metas | Total Hombres Metas | Total Hombres | % Hombres Metas | p-value |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------|
| Personas bajo control por Hipertensión | PA < 140/90 mmHg | 584 | 1255 | 46,53% | 407626 | 653190 | 62,41% | 408210 | 654445 | 62,37% | 0.05 |
| Personas bajo control por Diabetes Mellitus | HbA1C<7% | 179 | 649 | 27,58% | 127949 | 301313 | 42,46% | 128128 | 301962 | 42,43% | 0.05 |
| | HbA1C<7% PA < 140/90mmHg y Colesterol LDL < 100 mg/dl | 94 | 649 | 14,48% | 43376 | 301313 | 14,40% | 43470 | 301962 | 14,40% | 0.9490 |
| Personas bajo control en riesgo CV alto | COLESTEROL LDL < 100 mg/dL | 195 | 490 | 39,80% | 106408 | 399990 | 26,60% | 106603 | 400480 | 26,62% | 0.05 |
| Personas bajo control con antecedentes de Enfermedad Cardiovascular (ECV) | En tratamiento con Ácido Acetilsalicílico | 61 | 107 | 57,01% | 34843 | 67247 | 51,81% | 34904 | 67354 | 51,82% | 0.2825 |
| | En tratamiento con Estatina | 46 | 107 | 42,99% | 32404 | 67247 | 48,19% | 32450 | 67354 | 48,18% | 0.2825 |

Elaboración propia.

Como se puede observar en la *Tabla 15.1*, existen más hombres chilenos en control por hipertensión y normotensos (62%) comparado con misma población en personas migrantes internacionales (46%) y más hombres chilenos con hemoglobina glicosilada menor a 7% (42%) que los mismos en migrantes internacionales (27%). No obstante, una menor proporción de hombres chilenos en control reportó LDL menor a 100 (26%) comparado con hombres migrantes (39%), en todos estos casos con diferencias significativas entre los grupos de comparación.

Tabla 15.2 Población de mujeres inmigrantes y de chilenos en el Programa de Salud Cardiovascular con patologías compensadas. Total país, año 2015.

| Concepto | | Total Mujeres Inmigrantes Metas | Total Mujeres Inmigrantes | % Mujeres Inmigrantes Metas | Total Mujeres chilenas Metas | Total Mujeres chilenas | % Mujeres chilenas Metas | Total Mujeres Metas | Total Mujeres | % Mujeres Metas | p-value |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------|
| Personas bajo control por Hipertensión | PA < 140/90 mmHg | 1229 | 2201 | 55,84% | 750490 | 1120215 | 67,00% | 751719 | 1122416 | 66,97% | 0.0000 |
| | HbA1C<7% | 371 | 1085 | 34,19% | 216537 | 477248 | 45,37% | 216908 | 478333 | 45,35% | 0.0001 |
| Personas bajo control por Diabetes Mellitus | HbA1C<7% PA < 140/90mmHg y Colesterol LDL < 100 mg/dl | 176 | 1085 | 16,22% | 68817 | 477248 | 14,42% | 68993 | 478333 | 14,42% | 0.0916 |
| | COLESTEROL LDL < 100 mg/dL | 220 | 702 | 31,34% | 142378 | 585696 | 24,31% | 142598 | 586398 | 24,32% | 0.000 |
| Personas bajo control con antecedentes de Enfermedad Cardiovascular (ECV) | En tratamiento con Ácido Acetilsalicílico | 57 | 98 | 58,16% | 30514 | 59180 | 51,56% | 30571 | 59278 | 51,57% | 0.1913 |
| | En tratamiento con Estatina | 41 | 98 | 41,84% | 28666 | 59180 | 48,44% | 28707 | 59278 | 48,43% | 0.1913 |

Elaboración propia.

Se observan diferencias significativas a favor de las mujeres chilenas en control por hipertensión comparado con migrantes internacionales para el total del país, tanto para valores de PA en rangos normales (67% versus 55%) como en HbA1C menor a 7% (45% versus 34%), respectivamente. Similar a los hombres, más mujeres migrantes reportaron colesterol LDL menor a 100 comparado con mujeres chilenas (31% versus 24%). Las tablas del Anexo 8.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y chilena en el Programa de Salud Cardiovascular con patologías compensadas.

P5: Programa de Salud del Adulto Mayor

El programa de Salud del Adulto Mayor, está compuesto por 7 secciones, distribuidas según las siguientes prestaciones:

Sección A: población en control por condición de funcionalidad

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P5180100 | Población en control por condición de funcionalidad - autovalente sin riesgo |
| P5180200 | Población en control por condición de funcionalidad - autovalente con riesgo |
| P5300510 | Población en control por condición de funcionalidad - riesgo de dependencia |
| P5300100 | Población en control por condición de funcionalidad - dependiente leve |
| P5300200 | Población en control por condición de funcionalidad - dependiente moderado |
| P5300520 | Población en control por condición de funcionalidad - dependiente grave |
| P5300530 | Población en control por condición de funcionalidad - dependiente total |
| P5180100 | Población en control por condición de funcionalidad - autovalente sin riesgo |
| P5180200 | Población en control por condición de funcionalidad - autovalente con riesgo |
| P5300510 | Población en control por condición de funcionalidad - riesgo de dependencia |
| P5300100 | Población en control por condición de funcionalidad - dependiente leve |

| | |
|-----------------|--|
| P5300200 | Población en control por condición de funcionalidad - dependiente moderado |
| P5300520 | Población en control por condición de funcionalidad - dependiente grave |
| P5300530 | Población en control por condición de funcionalidad - dependiente total |

Sección A.1: existencia de población en control en programa "más adultos mayores autovalentes" por condición de funcionalidad

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P5300570 | Existencia de población en control en programa "más adultos mayores autovalentes" por condición de funcionalidad autovalente sin riesgo |
| P5300580 | Existencia de población en control en programa "más adultos mayores autovalentes" por condición de funcionalidad autovalente con riesgo |
| P5300590 | Existencia de población en control en programa "más adultos mayores autovalentes" por condición de funcionalidad riesgo de dependencia |

Sección B: población bajo control por estado nutricional

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P5190200 | Población bajo control por estado nutricional - bajo peso |
| P5190300 | Población bajo control por estado nutricional - normal |
| P5190400 | Población bajo control por estado nutricional - sobrepeso |
| P5200100 | Población bajo control por estado nutricional - obeso |

Sección C: adultos mayores con sospecha de maltrato

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P5300400 | Adultos mayores con sospecha de maltrato - personas con sospecha de maltrato |

Sección D: adultos mayores en actividad física

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P5300500 | Adultos mayores en actividad física - personas en actividad física |

Sección E: población de adultos mayores institucionalizados

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P5200300 | Población de adultos mayores institucionalizados - adultos mayores institucionalizados |
| P5200200 | Población de adultos mayores institucionalizados - adultos mayores dependencia severa |

Sección F: adultos mayores con riesgo de caídas

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P5300540 | Adultos mayores con riesgo de caídas-normal |
| P5300550 | Adultos mayores con riesgo de caídas-leve |
| P5300560 | Adultos mayores con riesgo de caídas-alto |

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos relativos a población inmigrante para las secciones A, A.1 y B.



Sección A: población en control por condición de funcionalidad

Para el total del país, no se observan diferencias significativas entre migrantes internacionales y locales, hombres y mujeres por separado, respecto del control por condición de funcionalidad. En ambos se observa una mayor proporción de persona con riesgo de dependencia, en un rango entre 40 y 50% al observar los distintos grupos (Tabla 16.1).

Lo mismo se observa para todas las regiones del país en forma desagregada, como se detalla en las tablas de las siguientes páginas, para las cuales los tamaños absolutos son tan bajos en población migrante que no se hizo estimación de comparación entre grupos con valor p asociado con un 95% de confianza. Las tablas del Anexo 9.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de las personas inmigrantes y chilenas en control por condición de funcionalidad.

Tabla 16.1 Población de personas inmigrantes y chilenas en control por condición de funcionalidad. Total país por sexo, año 2015.

| Condición de funcionalidad | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Autovalente con riesgo | 147 | 50,17% | 148112 | 45,98% | 148259 | 0.1504 |
| Autovalente sin riesgo | 67 | 22,87% | 87661 | 27,21% | 87728 | 0.0946 |
| Riesgo de dependencia | 36 | 12,29% | 45512 | 14,13% | 45548 | 0.3654 |
| Subtotal (EFAM) | 250 | | 281285 | | 281535 | |
| Dependiente leve | 26 | 8,87% | 23605 | 7,33% | 23631 | 0.3103 |
| Dependiente moderado | 5 | 1,71% | 6419 | 1,99% | 6424 | 0.7259 |
| Dependiente grave | 8 | 2,73% | 4954 | 1,54% | 4962 | 0.0975 |
| Dependiente total | 4 | 1,37% | 5849 | 1,82% | 5853 | 0.5636 |
| Subtotal (Indice Barthel) | 43 | | 40827 | | 40870 | |
| Total general | 293 | | 322112 | | 322405 | |
| Condición de funcionalidad | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
| Autovalente con riesgo | 185 | 45,23% | 206016 | 40,30% | 206201 | 0.0124 |
| Autovalente sin riesgo | 104 | 25,43% | 146759 | 28,71% | 146863 | 0.1427 |
| Riesgo de dependencia | 72 | 17,60% | 81658 | 15,97% | 81730 | 0.3683 |
| Subtotal (EFAM) | 361 | | 434433 | | 434794 | |
| Dependiente leve | 40 | 9,78% | 43923 | 8,59% | 43963 | 0.3915 |
| Dependiente moderado | 3 | 0,73% | 11918 | 2,33% | 11921 | 0.0214 |
| Dependiente grave | 4 | 0,98% | 9302 | 1,82% | 9306 | 0.2030 |
| Dependiente total | 1 | 0,24% | 11638 | 2,28% | 11639 | 0.0000 |
| Subtotal (Indice Barthel) | 48 | | 76781 | | 76829 | |
| Total general | 409 | | 511214 | | 511623 | |

Elaboración propia.

Sección B: población bajo control por estado nutricional

Continuando con el análisis de la sección de prestaciones del adulto mayor, se observa que la mayor proporción de población bajo control por estado nutricional se encuentra en estado normal, tanto para hombres como para mujeres (40.8% hombres y 35.2% mujeres, respectivamente). Mayor detalle se puede apreciar en la *Tabla 18.1*.

De la información disponible destacan las regiones metropolitana, primera y décimo-quinta, que se detallan en las Tablas 18.14, 18.2 y 18.16 a continuación. Las proporciones se mantienen estables respecto de la población total, con mayor porcentaje para hombres y mujeres adultos mayores normopeso. Las tablas del Anexo 10.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile la población bajo control por estado nutricional.

Tabla 18.1 Salud del Adulto Mayor (P5), Sección B: población bajo control por estado nutricional. Total País por sexo, año 2015.

| Estado nutricional | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Bajo peso | 41 | 12,89% | 34447 | 10,06% | 34488 | 0.0928 |
| Normal | 130 | 40,88% | 141312 | 41,26% | 141442 | 0.8920 |
| Sobrepeso | 88 | 27,67% | 104968 | 30,64% | 105056 | 0.2505 |
| Obeso | 59 | 18,55% | 61802 | 18,04% | 61861 | 0.8129 |
| Total | 318 | | 342529 | | 342847 | |
| Estado nutricional | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
| Bajo peso | 47 | 9,40% | 55132 | 10,19% | 55179 | 0.5608 |
| Normal | 176 | 35,20% | 182002 | 33,63% | 182178 | 0.4576 |
| Sobrepeso | 143 | 28,60% | 152959 | 28,26% | 153102 | 0.8673 |
| Obeso | 134 | 26,80% | 151098 | 27,92% | 151232 | 0.5770 |
| Total | 500 | | 541191 | | 541691 | |

Elaboración propia.

P6: Programa de Salud mental en atención primaria y especialidad

El programa de Salud mental en atención primaria y especialidad, está compuesto por 4 secciones, distribuidas según las siguientes prestaciones:

Sección A.1: población en control en aps al corte

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P6221000 | Atención primaria-número de personas en control en el programa |
| P6221100 | Atención primaria-factores de riesgo y condicionantes de la salud mental - violencia de género - víctima |
| P6221200 | Atención primaria-factores de riesgo y condicionantes de la salud mental - violencia de género - agresor |
| P6221500 | Atención primaria-factores de riesgo y condicionantes de la salud mental - abuso sexual |
| P6227601 | Atención primaria-factores de riesgo y condicionantes de la salud mental - personas con diagnósticos de trastornos mentales |
| P6221600 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del humor (afectivos), depresión leve |
| P6227500 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del humor (afectivos), depresión moderada |
| P6227600 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del humor (afectivos), depresión grave |
| P6221700 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del humor (afectivos), depresión post parto |
| P6221800 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del humor (afectivos), trastorno bipolar |
| P6221900 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo sustancias psicotrópicas - dependencia de alcohol |

| | |
|-----------------|---|
| P6222000 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo sustancias psicotrópicas -consumo perjudicial o dependencia de drogas |
| P6222100 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo sustancias psicotrópicas - policonsumo |
| P6222600 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos hipercinéticos |
| P6223060 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno disocial desafiante y opositor |
| P6223070 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno de ansiedad de separación en la infancia |
| P6223080 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - otros trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia |
| P6222200 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno de la ansiedad |
| P6222300 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - Alzheimer y otras demencias |
| P6223030 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos conductuales asociados a demencia |
| P6222400 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - esquizofrenia |
| P6227400 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - primer episodio esquizofrenia con ocupación regular |
| P6222500 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno de la conducta alimentaria |
| P6222800 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - retraso mental |
| P6222900 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno de personalidad |

| | |
|-----------------|--|
| P6223000 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno generalizados del desarrollo |
| P6227602 | Atención primaria-diagnósticos de trastornos mentales - otras |

Sección A.2: programa de rehabilitación en atención primaria (personas con trastornos psiquiátricos)

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P6223040 | Atención primaria-programa de rehabilitación (personas con trastornos psiquiátricos programa de rehabilitación tipo i (nº de personas en control en el programa) |
| P6223050 | Atención primaria-programa de rehabilitación (personas con trastornos psiquiátricos programa de rehabilitación tipo ii (nº de personas en control en el programa) |

Sección B.1: población en control en especialidad al corte

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P6223090 | Atención de especialidad-número de personas en control en el programa |
| P6223100 | Atención de especialidad-factores de riesgo y condicionantes de la salud mental - violencia de género - víctima |
| P6223110 | Atención de especialidad-factores de riesgo y condicionantes de la salud mental - violencia de género - agresor |
| P6223140 | Atención de especialidad-factores de riesgo y condicionantes de la salud mental - abuso sexual |
| P6223170 | Atención de especialidad-personas con diagnósticos de trastornos mentales |
| P6223180 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del humor (afectivos), depresión refractaria |

| | |
|-----------------|--|
| P6223190 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del humor (afectivos), depresión grave con psicosis |
| P6223200 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del humor (afectivos), depresión con alto riesgo suicida |
| P6223210 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del humor (afectivos), depresión post parto |
| P6223220 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos del humor (afectivos), trastorno bipolar |
| P6223230 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo sustancias psicotrópicas - consumo perjudicial o dependencia de alcohol |
| P6223240 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo sustancias psicotrópicas - consumo perjudicial o dependencia de drogas |
| P6223250 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo sustancias psicotrópicas - policonsumo |
| P6223260 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos hipercinéticos |
| P6223270 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno disocial desafiante y oposicionista |
| P6223280 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno de ansiedad de separación en la infancia |
| P6223290 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - otros trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia |
| P6223300 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno de la ansiedad |
| P6223310 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - Alzheimer y otras demencias |

| | |
|-----------------|--|
| P6223320 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastornos conductuales asociados a demencia |
| P6223330 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - esquizofrenia |
| P6223340 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - primer episodio esquizofrenia con ocupación regular |
| P6223350 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno de la conducta alimentaria |
| P6223360 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - retraso mental |
| P6223370 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno de personalidad |
| P6223380 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - trastorno generalizados del desarrollo |
| P6227603 | Atención de especialidad-diagnósticos de trastornos mentales - otras |

Sección B.2: programa de rehabilitación en especialidad (personas con trastornos psiquiátricos)

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P6223390 | Atención de especialidad-programa de rehabilitación (personas con trastornos psiquiátricos programa de rehabilitación tipo i (nº de personas en control en el programa) |
| P6223400 | Atención de especialidad-programa de rehabilitación (personas con trastornos psiquiátricos programa de rehabilitación tipo ii (nº de personas en control en el programa) |

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos relativos a población inmigrante para la sección A.1 Y B.1



Sección A.1: población en control en APS al corte

Para el año 2015, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 288 hombres migrantes y 691 mujeres migrantes en control de APS por salud mental en todo el país. Para los hombres, los valores relativos sugieren mayor proporción de hombres migrantes agresores y con consumo riesgoso de drogas que hombres chilenos, pero los valores absolutos son muy bajos como para una interpretación más amplia y formal de estos resultados.

Las tablas presentadas a continuación dan cuenta de los valores absolutos y relativos de estos casos por región del país. La mayoría de los casos presenta menos de 5 casos por región con lo que la estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia, con la excepción de RM que tiene un poco más de casos. No obstante, todas las tablas se detallan para conocimiento y completitud de la información. Las tablas del Anexo 11.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile la población en control en atención primaria en salud mental al corte con factores de riesgo.

Tabla 19.1 Población en control en atención primaria en salud mental al corte. Total País por sexo, año 2015.

| Concepto | | | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|--|---|---------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| N° de personas en control en el programa | | | 288 | 100,00% | 195713 | 100,00% | 196001 | |
| Factores de riesgo y condicionantes de la Salud Mental | Violencia de género | Víctima | 3 | 1,04% | 1350 | 0,69% | 1353 | 0.4711 |
| | | Agresor | 15 | 5,21% | 4358 | 2,23% | 4373 | 0.0000 |
| | Violencia hacia el Adulto Mayor | | 1 | 0,35% | 178 | 0,09% | 179 | 0.1502 |
| | Maltrato de niños, niñas y adolescentes | | 7 | 2,43% | 3735 | 1,91% | 3742 | 0.5176 |
| | Abuso sexual | | 0 | 0,00% | 503 | 0,26% | 503 | 0.3890 |
| | Consumo bajo riego de alcohol | | 5 | 1,74% | 4934 | 2,52% | 4939 | 0.3957 |
| | Consumo riesgoso de alcohol | | 5 | 1,74% | 6643 | 3,39% | 6648 | 0.1203 |
| | Consumo riesgoso de drogas | | 13 | 4,51% | 2978 | 1,52% | 2991 | 0.0000 |
| Concepto | | | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
| N° de personas en control en el programa | | | 691 | 100,00% | 451314 | 100,00% | 452005 | |
| Factores de riesgo y condicionantes de la Salud Mental | Violencia de género | Víctima | 141 | 20,41% | 27432 | 6,08% | 27573 | 0.0421 |
| | | Agresor | 27 | 3,91% | 1495 | 0,33% | 1522 | 0.6321 |
| | Violencia hacia el Adulto Mayor | | 2 | 0,29% | 592 | 0,13% | 594 | 0.2512 |
| | Maltrato de niños, niñas y adolescentes | | 7 | 1,01% | 3660 | 0,81% | 3667 | 0.5541 |
| | Abuso sexual | | 22 | 3,18% | 1582 | 0,35% | 1604 | 0.3654 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----|-------|------|-------|------|--------|
| | Consumo bajo riesgo de alcohol | 13 | 1,88% | 5665 | 1,26% | 5678 | 0.1398 |
| | Consumo riesgoso de alcohol | 2 | 0,29% | 2101 | 0,47% | 2103 | 0.4967 |
| | Consumo riesgoso de drogas | 9 | 1,30% | 1648 | 0,37% | 1657 | 0.9541 |

Elaboración propia.



Para el año 2015, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 135 hombres migrantes y 406 mujeres migrantes en control de APS con diagnóstico de trastornos mentales en todo el país. En hombres los tres principales diagnósticos son trastornos ansiosos, trastornos hipercinéticos y depresión leve. En estos tres casos los porcentajes son superiores en hombres migrantes comparado con hombres chilenos. En mujeres el trastorno ansioso y la depresión leve son los problemas más reportados, en ambos casos con proporciones superiores a mujeres chilenas.

Las tablas presentadas a continuación dan cuenta de los valores absolutos y relativos de estos casos por región del país. La mayoría de los casos presenta menos de 5 casos por región con lo que la estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia, con la excepción de RM que tiene un poco más de casos. No obstante, todas las tablas se detallan para conocimiento y completitud de la información. Las tablas del Anexo 12.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile la población en control en atención primaria en salud mental al corte con diagnóstico de trastornos mentales.

Tabla 20.1 Población en control en atención primaria en salud mental al corte. Total País Hombres, año 2015.

| Concepto | | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Personas con diagnóstico de trastornos mentales | | 135 | | 170609 | | 170744 | |
| Trastornos del Humor (Afectivos) | Depresión Leve | 45 | 33,33% | 10621 | 6,23% | 10666 | 0.0214 |
| | Depresión Moderada | 21 | 15,56% | 18966 | 11,12% | 18987 | 0.1010 |
| | Depresión Grave | 7 | 5,19% | 2915 | 1,71% | 2922 | 0.365 |
| | Depresión Post Parto | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | NA |
| | Trastorno Bipolar | 2 | 1,48% | 629 | 0,37% | 631 | 0.6547 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo de sustancias psicotrópicas | Consumo perjudicial o Dependencia de alcohol | 21 | 15,56% | 14244 | 8,35% | 14265 | 0.0654 |
| | Consumo perjudicial o Dependencia como droga principal | 5 | 3,70% | 6338 | 3,71% | 6343 | 0.9945 |
| | Policonsumo | 5 | 3,70% | 6928 | 4,06% | 6933 | 0.8336 |
| Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | Trastorno Hipercinético | 57 | 42,22% | 28295 | 16,58% | 28352 | 0.0254 |
| | Trastorno disocial desafiante y oposicionista | 1 | 0,74% | 1621 | 0,95% | 1622 | 0.8020 |
| | Trastorno de ansiedad de separación en la infancia | 1 | 0,74% | 686 | 0,40% | 687 | 0.5344 |
| | Otros trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | 58 | 42,96% | 34809 | 20,40% | 34867 | 0.0584 |

| | | | | | | |
|--|----|--------|-------|--------|-------|--------|
| Trastorno de ansiedad | 72 | 53,33% | 43111 | 25,27% | 43183 | 0.0458 |
| Alzheimer y otras demencias | 3 | 2,22% | 1873 | 1,10% | 1876 | 0.2103 |
| Trastornos conductuales asociados a demencia | 1 | 0,74% | 325 | 0,19% | 326 | 0.1432 |
| Esquizofrenia | 0 | 0,00% | 2015 | 1,18% | 2015 | 0.2040 |
| Primer episodio de esquizofrenia con ocupación regular | 0 | 0,00% | 38 | 0,02% | 38 | 0.8623 |
| Trastornos de la conducta alimentaria | 1 | 0,74% | 847 | 0,50% | 848 | 0.6865 |
| Retraso Mental | 0 | 0,00% | 3091 | 1,81% | 3091 | 0.1145 |
| Trastorno de personalidad | 4 | 2,96% | 4970 | 2,91% | 4974 | 0.9725 |
| Trastornos generalizados del desarrollo | 3 | 2,22% | 1526 | 0,89% | 1529 | 0.1016 |

Elaboración propia.

Tabla 20.2 Población en control en atención primaria en salud mental al corte. Total País Mujeres, año 2015.

| Concepto | | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
|---|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Personas con diagnóstico de trastornos mentales | | 406 | 100,00% | 404952 | 100,00% | 405358 | |
| Trastornos del Humor (Afectivos) | Depresión Leve | 184 | 45,32% | 56291 | 13,90% | 56475 | 0.0365 |
| | Depresión Moderada | 140 | 34,48% | 116397 | 28,74% | 116537 | 0.0954 |
| | Depresión Grave | 43 | 10,59% | 11718 | 2,89% | 11761 | 0.5123 |
| | Depresión Post Parto | 13 | 3,20% | 3122 | 0,77% | 3135 | 0.9564 |
| | Trastorno Bipolar | 1 | 0,25% | 1892 | 0,47% | 1893 | 0.5140 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo de sustancias psicotrópicas | Consumo perjudicial o Dependencia de alcohol | 13 | 3,20% | 3934 | 0,97% | 3947 | 0.9856 |
| | Consumo perjudicial o Dependencia como droga principal | 5 | 1,23% | 3601 | 0,89% | 3606 | 0.4629 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Policonsumo | 1 | 0,25% | 2448 | 0,60% | 2449 | 0.3519 |
| Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | Trastorno Hipercinético | 16 | 3,94% | 10265 | 2,53% | 10281 | 0.0717 |
| | Trastorno disocial desafiante y opositor | 1 | 0,25% | 931 | 0,23% | 932 | 0.9450 |
| | Trastorno de ansiedad de separación en la infancia | 1 | 0,25% | 720 | 0,18% | 721 | 0.7433 |
| | Otros trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | 37 | 9,11% | 32115 | 7,93% | 32152 | 0.3781 |
| Trastorno de ansiedad | | 354 | 87,19% | 158848 | 39,23% | 159202 | ** |
| Alzheimer y otras demencias | | 5 | 1,23% | 3801 | 0,94% | 3806 | 0.5408 |
| Trastornos conductuales asociados a demencia | | 0 | 0,00% | 433 | 0,11% | 433 | 0.5097 |
| Esquizofrenia | | 0 | 0,00% | 1975 | 0,49% | 1975 | 0.1584 |
| Primer episodio de esquizofrenia con ocupación regular | | 0 | 0,00% | 47 | 0,01% | 47 | 0.8281 |
| Trastornos de la conducta alimentaria | | 3 | 0,74% | 3018 | 0,75% | 3021 | 0.9881 |
| Retraso Mental | | 1 | 0,25% | 4014 | 0,99% | 4015 | 0.1298 |
| Trastorno de personalidad | | 24 | 5,91% | 22091 | 5,46% | 22115 | 0.6859 |
| Trastornos generalizados del desarrollo | | 2 | 0,49% | 964 | 0,24% | 966 | 0.2931 |

Elaboración propia.



Sección B.1: población en control en especialidad al corte

Para el año 2015, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 11 hombres migrantes y 7 mujeres migrantes en control de especialidad por salud mental en todo el país. De estos, la mayoría en RM. Para los hombres, los valores relativos sugieren mayor proporción de hombres migrantes agresores y mujeres migrantes víctimas comparado con mujeres chilenas.

La mayoría de los casos presenta escasos casos por región con lo que la estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia. Por esta razón, la descripción de cada una de las regiones para esta sección se omitió, a excepción de RM que concentra la mayoría de los casos.

Tabla 21.1 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total País por sexo, año 2015.

| Concepto | | | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres |
|--|---|---------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| N° de personas en control en el programa | | | 11 | | 54162 | | 54173 |
| Factores de riesgo y condicionantes de la Salud Mental | Violencia de género | Víctima | 0 | 0,00% | 298 | 0,55% | 298 |
| | | Agresor | 5 | 45,45% | 1536 | 2,84% | 1541 |
| | Violencia hacia el Adulto Mayor | | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| | Maltrato de niños, niñas y adolescentes | | 0 | 0,00% | 968 | 1,79% | 968 |
| | Abuso sexual | | 0 | 0,00% | 91 | 0,17% | 91 |
| | Consumo riesgoso de alcohol | | 0 | 0,00% | 210 | 0,39% | 210 |
| | Consumo riesgoso de drogas | | 0 | 0,00% | 859 | 1,59% | 859 |
| Concepto | | | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres |
| N° de personas en control en el programa | | | 7 | | 70077 | | 70084 |
| Factores de riesgo y condicionantes de la Salud Mental | Violencia de género | Víctima | 4 | 57,14% | 2035 | 2,90% | 2039 |
| | | Agresor | 2 | 28,57% | 758 | 1,08% | 760 |
| | Violencia hacia el Adulto Mayor | | 0 | 0,00% | 4 | 0,01% | 4 |
| | Maltrato de niños, niñas y adolescentes | | 1 | 14,29% | 793 | 1,13% | 794 |
| | Abuso sexual | | 0 | 0,00% | 212 | 0,30% | 212 |
| | Consumo riesgoso de alcohol | | 0 | 0,00% | 86 | 0,12% | 86 |
| | Consumo riesgoso de drogas | | 0 | 0,00% | 360 | 0,51% | 360 |

Elaboración propia.

Tabla 21.2 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total RM por sexo, año 2015.

| Concepto | | | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres |
|--|---|---------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| N° de personas en control en el programa | | | 7 | | 30658 | | 30665 |
| Factores de riesgo y condicionantes de la Salud Mental | Violencia de género | Víctima | 0 | 0,00% | 228 | 0,74% | 228 |
| | | Agresor | 5 | 71,43% | 1214 | 3,96% | 1219 |
| | Violencia hacia el Adulto Mayor | | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| | Maltrato de niños, niñas y adolescentes | | 0 | 0,00% | 876 | 2,86% | 876 |
| | Abuso sexual | | 0 | 0,00% | 56 | 0,18% | 56 |
| | Consumo riesgoso de alcohol | | 0 | 0,00% | 63 | 0,21% | 63 |
| | Consumo riesgoso de drogas | | 0 | 0,00% | 357 | 1,16% | 357 |
| Concepto | | | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres |
| N° de personas en control en el programa | | | 5 | | 37334 | | 37339 |
| Factores de riesgo y condicionantes de la Salud Mental | Violencia de género | Víctima | 4 | 80,00% | 1649 | 4,42% | 1653 |
| | | Agresor | 2 | 40,00% | 593 | 1,59% | 595 |
| | Violencia hacia el Adulto Mayor | | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| | Maltrato de niños, niñas y adolescentes | | 1 | 20,00% | 680 | 1,82% | 681 |
| | Abuso sexual | | 0 | 0,00% | 129 | 0,35% | 129 |
| | Consumo riesgoso de alcohol | | 0 | 0,00% | 28 | 0,07% | 28 |
| | Consumo riesgoso de drogas | | 0 | 0,00% | 158 | 0,42% | 158 |

Elaboración propia.



Para el año 2015, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 6 hombres migrantes y 4 mujeres migrantes en control de especialidad con diagnóstico de trastornos mentales en todo el país. En hombres el principal diagnóstico es trastornos ansiosos. En mujeres el trastorno ansioso es el problema más reportado.

Las tablas presentadas a continuación dan cuenta de los valores absolutos y relativos de estos casos por región del país. La mayoría de los casos presenta menos de 5 casos por región con lo que la estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia, con la excepción de RM que tiene un poco más de casos.

Tabla 20.1 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total País Hombres, año 2015.

| Concepto | | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres |
|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| Personas con diagnóstico de trastornos mentales | | 6 | | 37573 | | 37579 |
| Trastornos del Humor (Afectivos) | Depresión Refractaria | 0 | 0,00% | 1661 | 4,42% | 1661 |
| | Depresión Grave con psicosis | 0 | 0,00% | 1696 | 4,51% | 1696 |
| | Depresión con alto riesgo suicida | 0 | 0,00% | 1200 | 3,19% | 1200 |
| | Depresión Post Parto | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| | Trastorno Bipolar | 0 | 0,00% | 2626 | 6,99% | 2626 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo de sustancias psicotrópicas | Consumo perjudicial o Dependencia de alcohol | 0 | 0,00% | 3163 | 8,42% | 3163 |
| | Consumo perjudicial o Dependencia como droga principal | 0 | 0,00% | 2038 | 5,42% | 2038 |
| | Policonsumo | 2 | 33,33% | 3930 | 10,46% | 3932 |
| Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | Trastorno Hipercinético | 1 | 16,67% | 6212 | 16,53% | 6213 |
| | Trastorno disocial desafiante y opositor | 1 | 16,67% | 574 | 1,53% | 575 |
| | Trastorno de ansiedad de separación en la infancia | 0 | 0,00% | 131 | 0,35% | 131 |
| | Otros trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | 2 | 33,33% | 5643 | 15,02% | 5645 |
| Trastorno de ansiedad | | 6 | 100,00% | 5057 | 13,46% | 5063 |
| Alzheimer y otras demencias | | 1 | 16,67% | 2026 | 5,39% | 2027 |

| | | | | | |
|--|---|--------|------|--------|------|
| Trastornos conductuales asociados a demencia | 0 | 0,00% | 323 | 0,86% | 323 |
| Esquizofrenia | 1 | 16,67% | 7350 | 19,56% | 7351 |
| Primer episodio de esquizofrenia con ocupación regular | 0 | 0,00% | 637 | 1,70% | 637 |
| Trastornos de la conducta alimentaria | 0 | 0,00% | 218 | 0,58% | 218 |
| Retraso Mental | 0 | 0,00% | 2060 | 5,48% | 2060 |
| Trastorno de personalidad | 0 | 0,00% | 2335 | 6,21% | 2335 |
| Trastornos generalizados del desarrollo | 1 | 16,67% | 1661 | 4,42% | 1662 |

Elaboración propia.

Tabla 20.2 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total País Mujeres, año 2015.

| Concepto | | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres |
|---|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| Personas con diagnóstico de trastornos mentales | | 4 | | 49182 | | 49186 |
| Trastornos del Humor (Afectivos) | Depresión Refractaria | 0 | 0,00% | 5583 | 11,35% | 5583 |
| | Depresión Grave con psicosis | 1 | 25,00% | 6296 | 12,80% | 6297 |
| | Depresión con alto riesgo suicida | 1 | 25,00% | 4402 | 8,95% | 4403 |
| | Depresión Post Parto | 0 | 0,00% | 64 | 0,13% | 64 |
| | Trastorno Bipolar | 0 | 0,00% | 7078 | 14,39% | 7078 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo de sustancias psicotrópicas | Consumo perjudicial o Dependencia de alcohol | 0 | 0,00% | 1294 | 2,63% | 1294 |
| | Consumo perjudicial o Dependencia como droga principal | 0 | 0,00% | 1224 | 2,49% | 1224 |
| | Policonsumo | 1 | 25,00% | 1892 | 3,85% | 1893 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---------|-------|--------|-------|
| Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | Trastorno Hipercinético | 2 | 50,00% | 1961 | 3,99% | 1963 |
| | Trastorno disocial desafiante y oposicionista | 0 | 0,00% | 213 | 0,43% | 213 |
| | Trastorno de ansiedad de separación en la infancia | 0 | 0,00% | 122 | 0,25% | 122 |
| | Otros trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | 2 | 50,00% | 4399 | 8,94% | 4401 |
| Trastorno de ansiedad | | 9 | 225,00% | 13003 | 26,44% | 13012 |
| Alzheimer y otras demencias | | 1 | 25,00% | 2490 | 5,06% | 2491 |
| Trastornos conductuales asociados a demencia | | 0 | 0,00% | 446 | 0,91% | 446 |
| Esquizofrenia | | 1 | 25,00% | 5827 | 11,85% | 5828 |
| Primer episodio de esquizofrenia con ocupación regular | | 0 | 0,00% | 326 | 0,66% | 326 |
| Trastornos de la conducta alimentaria | | 0 | 0,00% | 800 | 1,63% | 800 |
| Retraso Mental | | 0 | 0,00% | 1796 | 3,65% | 1796 |
| Trastorno de personalidad | | 0 | 0,00% | 7598 | 15,45% | 7598 |
| Trastornos generalizados del desarrollo | | 0 | 0,00% | 1029 | 2,09% | 1029 |

Elaboración propia.

Tabla 20.3 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total RM Hombres, año 2015.

| Concepto | | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres |
|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| Personas con diagnóstico de trastornos mentales | | 2 | | 23238 | | 23240 |
| Trastornos del Humor (Afectivos) | Depresión Refractaria | 0 | 0,00% | 453 | 1,95% | 453 |
| | Depresión Grave con psicosis | 0 | 0,00% | 810 | 3,49% | 810 |
| | Depresión con alto riesgo suicida | 0 | 0,00% | 581 | 2,50% | 581 |
| | Depresión Post Parto | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| | Trastorno Bipolar | 0 | 0,00% | 1002 | 4,31% | 1002 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo de sustancias psicotrópicas | Consumo perjudicial o Dependencia de alcohol | 0 | 0,00% | 1630 | 7,01% | 1630 |
| | Consumo perjudicial o Dependencia como droga principal | 0 | 0,00% | 1505 | 6,48% | 1505 |
| | Policonsumo | 2 | 100,00% | 2815 | 12,11% | 2817 |
| Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | Trastorno Hipercinético | 1 | 50,00% | 4444 | 19,12% | 4445 |
| | Trastorno disocial desafiante y oposicionista | 1 | 50,00% | 230 | 0,99% | 231 |
| | Trastorno de ansiedad de separación en la infancia | 0 | 0,00% | 78 | 0,34% | 78 |
| | Otros trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | 1 | 50,00% | 4207 | 18,10% | 4208 |
| Trastorno de ansiedad | | 5 | 250,00% | 2559 | 11,01% | 2564 |

| | | | | | |
|--|---|--------|------|--------|------|
| Alzheimer y otras demencias | 1 | 50,00% | 1141 | 4,91% | 1142 |
| Trastornos conductuales asociados a demencia | 0 | 0,00% | 134 | 0,58% | 134 |
| Esquizofrenia | 0 | 0,00% | 2959 | 12,73% | 2959 |
| Primer episodio de esquizofrenia con ocupación regular | 0 | 0,00% | 401 | 1,73% | 401 |
| Trastornos de la conducta alimentaria | 0 | 0,00% | 60 | 0,26% | 60 |
| Retraso Mental | 0 | 0,00% | 647 | 2,78% | 647 |
| Trastorno de personalidad | 0 | 0,00% | 1104 | 4,75% | 1104 |
| Trastornos generalizados del desarrollo | 0 | 0,00% | 704 | 3,03% | 704 |

Elaboración propia.

Tabla 20.4 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total RM Mujeres, año 2015.

| Concepto | | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres |
|---|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| Personas con diagnóstico de trastornos mentales | | 1 | | 27937 | | 27938 |
| Trastornos del Humor (Afectivos) | Depresión Refractaria | 0 | 0,00% | 1668 | 5,97% | 1668 |
| | Depresión Grave con psicosis | 0 | 0,00% | 2928 | 10,48% | 2928 |
| | Depresión con alto riesgo suicida | 0 | 0,00% | 2394 | 8,57% | 2394 |
| | Depresión Post Parto | 0 | 0,00% | 25 | 0,09% | 25 |
| | Trastorno Bipolar | 0 | 0,00% | 2571 | 9,20% | 2571 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo de sustancias psicotrópicas | Consumo perjudicial o Dependencia de alcohol | 0 | 0,00% | 635 | 2,27% | 635 |
| | Consumo perjudicial o Dependencia como droga principal | 0 | 0,00% | 885 | 3,17% | 885 |
| | Policonsumo | 1 | 100,00% | 1447 | 5,18% | 1448 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---------|------|--------|------|
| Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | Trastorno Hipercinético | 2 | 200,00% | 1432 | 5,13% | 1434 |
| | Trastorno disocial desafiante y oposicionista | 0 | 0,00% | 72 | 0,26% | 72 |
| | Trastorno de ansiedad de separación en la infancia | 0 | 0,00% | 67 | 0,24% | 67 |
| | Otros trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | 2 | 200,00% | 3165 | 11,33% | 3167 |
| Trastorno de ansiedad | | 8 | 800,00% | 7357 | 26,33% | 7365 |
| Alzheimer y otras demencias | | 1 | 100,00% | 1626 | 5,82% | 1627 |
| Trastornos conductuales asociados a demencia | | 0 | 0,00% | 224 | 0,80% | 224 |
| Esquizofrenia | | 1 | 100,00% | 2317 | 8,29% | 2318 |
| Primer episodio de esquizofrenia con ocupación regular | | 0 | 0,00% | 234 | 0,84% | 234 |
| Trastornos de la conducta alimentaria | | 0 | 0,00% | 232 | 0,83% | 232 |
| Retraso Mental | | 0 | 0,00% | 622 | 2,23% | 622 |
| Trastorno de personalidad | | 0 | 0,00% | 3512 | 12,57% | 3512 |
| Trastornos generalizados del desarrollo | | 0 | 0,00% | 723 | 2,59% | 723 |

Elaboración propia.

P7: Programa de Salud Familiar

El programa de Salud familiar, está compuesto por 3 secciones, distribuidas según las siguientes prestaciones:

Sección A: Clasificación de las familias (sector urbano)

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P7010100 | Clasificación de las familias sector urbano - n° de familias inscritas |
| P7010200 | Clasificación de las familias sector urbano - n° de familias evaluadas |
| P7010300 | Clasificación de las familias sector urbano - n° de familias en riesgo alto y mediano |

Sección B: intervención en familias (sector urbano)

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P7010400 | Intervención en familias (sector urbano) - n° de familias evaluadas en el semestre |
| P7010500 | Intervención en familias (sector urbano) - n° familias detectadas en riesgo en el semestre (mediano+alto) |
| P7010600 | Intervención en familias (sector urbano) - n° familias en riesgo alto ingresadas a plan de intervención en el semestre |

Sección C: Intervención en familias sector rural

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P7010700 | Intervención en familias sector rural-n° familias en el sector rural |

| | |
|-----------------|--|
| P7010800 | Intervención en familias sector rural-nº familias evaluadas en el semestre |
| P7010900 | Intervención en familias sector rural-nº de familias en riesgo alto ingresadas a plan de intervención en el semestre |
| P7020000 | Intervención en familias sector rural-nº de familias pesquisadas por técnico paramédico a estudio de familia |
| P7020100 | Intervención en familias sector rural-nº de encuestas familiares vigentes |

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, no se dispone de datos relativos a población inmigrante.

P8: Programa de Rehabilitación física

El programa de Rehabilitación física, está compuesto por 1 sección, distribuida según las siguientes prestaciones:

Sección A: existencia de población en control

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P8000100 | Nº pacientes en control en el programa |
| P8000200 | Pacientes en control -origen físico-síndrome doloroso de origen traumático |
| P8000300 | Pacientes en control -origen físico-síndrome doloroso de origen no traumático |
| P8000400 | Pacientes en control -origen físico-artrosis leve y moderada de rodilla y cadera |
| P8000500 | Pacientes en control -origen físico-secuela de acv |
| P8000600 | Pacientes en control -origen físico-secuelas de tec |
| P8001000 | Pacientes en control -origen físico-secuela trm |
| P8001100 | Pacientes en control -origen físico-secuela quemadura |
| P8000700 | Pacientes en control -origen físico-enfermedad de Parkinson |
| P8000800 | Pacientes en control -origen físico-otro déficit secundario con compromiso neuromuscular en menor de 20 años congénito |
| P8001200 | Pacientes en control -origen físico-otro déficit secundario con compromiso neuromuscular en menor de 20 años adquirido |
| P8001300 | Pacientes en control -origen físico-otro déficit secundario con compromiso neuromuscular en mayor de 20 años |

| | |
|-----------------|---|
| P8000900 | Pacientes en control -origen físico-otros |
| P8000910 | Pacientes en control -origen sensorial visual-congénito |
| P8000920 | Pacientes en control -origen sensorial visual-adquirido |
| P8000930 | Pacientes en control -origen sensorial visual-otros |
| P8000940 | Pacientes en control -origen sensorial auditivo-congénito |
| P8000950 | Pacientes en control -origen sensorial auditivo-adquirido |
| P8000960 | Pacientes en control -origen sensorial auditivo-otros |

De acuerdo a la información registrada en esta sección, dispone de datos relativos a población inmigrante la sección A.

Sección A: existencia de población en control programa de Rehabilitación física

Existen 1983 hombres y 6522 mujeres migrantes internacionales inscritas en el programa de rehabilitación física y 44598 hombres y 91952 mujeres inscritas en el mismo programa. Las principales razones de inscripción en migrantes son de origen físico: otras, origen no traumático, traumático, y artrosis leve de rodilla y cadera. En chilenos las principales razones son de origen físico: no traumático, artrosis de rodilla y cadera.

Patrones similares se observan en las XV regiones del país, tal y como se detalla en las tablas a continuación. Las tablas del Anexo 13.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile la población en control en el programa de Rehabilitación física.

Tabla 21.1 Población en control en el programa de Rehabilitación física. Total País hombres, año 2015.

| Origen | Problemas de Salud | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|--|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Número de personas en control en el programa | | 1983 | 100,00% | 44598 | 100,00% | 46581 | |
| Origen físico | Origen traumático | 196 | 9,88% | 6624 | 14,85% | 6820 | 0.0000 |
| | Origen no traumático | 267 | 13,46% | 14941 | 33,50% | 15208 | 0.0000 |
| | Artrosis leve y moderada de rodilla y cadera | 209 | 10,54% | 8250 | 18,50% | 8459 | 0.0000 |
| | Secuela de ACV | 83 | 4,19% | 3954 | 8,87% | 4037 | 0.0000 |
| | Secuela de TEC | 5 | 0,25% | 237 | 0,53% | 242 | 0.0905 |
| | Secuela TRM | 1 | 0,05% | 164 | 0,37% | 165 | 0.0200 |
| | Secuela quemadura | 1 | 0,05% | 46 | 0,10% | 47 | 0.4694 |
| | Enfermedad de Parkinson | 17 | 0,86% | 1428 | 3,20% | 1445 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|--------|------|--------|------|--------|
| | Compromiso neuromuscular en menor de 20 años congénito | 0 | 0,00% | 679 | 1,52% | 679 | 0.0000 |
| | Otro deficit secundario con compromiso neuromuscular en menor de 20 años adquirido | 0 | 0,00% | 282 | 0,63% | 282 | 0.0004 |
| | Compromiso neuromuscular en mayor de 20 años | 63 | 3,18% | 2356 | 5,28% | 2419 | 0.0000 |
| | Otros | 1072 | 54,06% | 6297 | 14,12% | 7369 | 0.0000 |
| Origen sensorial visual | Congénito | 0 | 0,00% | 18 | 0,04% | 18 | 0.3709 |
| | Adquirido | 1 | 0,05% | 65 | 0,15% | 66 | 0.2695 |
| | Otros | 0 | 0,00% | 4 | 0,01% | 4 | 0.6732 |
| Origen sensorial auditivo | Congénito | 1 | 0,05% | 10 | 0,02% | 11 | 0.4271 |
| | Adquirido | 0 | 0,00% | 53 | 0,12% | 53 | 0.1245 |
| | Otros | 4 | 0,20% | 44 | 0,10% | 48 | 0.1616 |

Elaboración propia.

Tabla 21.2 Población en control en el programa de Rehabilitación física. Total País Mujeres, año 2015.

| Origen | Problemas de Salud | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
|--|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Número de personas en control en el programa | | 6522 | 100,00% | 91952 | 100,00% | 98474 | |
| Origen físico | Origen traumático | 302 | 4,63% | 9242 | 10,05% | 9544 | 0.0000 |
| | Origen no traumático | 705 | 10,81% | 38498 | 41,87% | 39203 | 0.0000 |
| | Artrosis leve y moderada de rodilla y cadera | 630 | 9,66% | 26325 | 28,63% | 26955 | 0.0000 |
| | Secuela de ACV | 63 | 0,97% | 3478 | 3,78% | 3541 | 0.0000 |
| | Secuela de TEC | 2 | 0,03% | 81 | 0,09% | 83 | 0.1225 |
| | Secuela TRM | 1 | 0,02% | 140 | 0,15% | 141 | 0.0047 |
| | Secuela quemadura | 0 | 0,00% | 42 | 0,05% | 42 | 0.0843 |
| | Enfermedad de Parkinson | 22 | 0,34% | 1365 | 1,48% | 1387 | 0.0000 |
| | Compromiso neuromuscular en menor de 20 años congénito | 0 | 0,00% | 490 | 0,53% | 490 | 0.0000 |
| | Otro déficit secundario con compromiso neuromuscular en menor de 20 años adquirido | 0 | 0,00% | 329 | 0,36% | 329 | 0.0000 |
| | Compromiso neuromuscular en mayor de 20 años | 76 | 1,17% | 4007 | 4,36% | 4083 | 0.0000 |
| Otros | 4683 | 71,80% | 9596 | 10,44% | 14279 | 0.0000 | |
| Origen sensorial visual | Congénito | 1 | 0,02% | 18 | 0,02% | 19 | 0.8116 |
| | Adquirido | 1 | 0,02% | 82 | 0,09% | 83 | 0.0471 |
| | Otros | 0 | 0,00% | 6 | 0,01% | 6 | 0.5142 |



| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----|-------|----|-------|-----|--------|
| Origen sensorial auditivo | Congénito | 1 | 0,02% | 11 | 0,01% | 12 | 0.8117 |
| | Adquirido | 0 | 0,00% | 41 | 0,04% | 41 | 0.0881 |
| | Otros | 11 | 0,17% | 89 | 0,10% | 100 | 0.0783 |

Elaboración propia.

P10: Programa Vida Sana

El programa Vida Sana, está compuesto por 2 secciones, distribuidas según las siguientes prestaciones:

Sección A: existencia de población en control

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P1000001 | Población en control número de personas en pvs |
| P1000002 | Población en control con estado nutricional-obeso |
| P1000003 | Población en control con estado nutricional-sobrepeso |
| P1000004 | Población en control con estado nutricional-normal |
| P1000005 | Población en control con diagnóstico de prehipertensión-obeso |
| P1000006 | Población en control con diagnóstico de prehipertensión-sobrepeso |
| P1000007 | Población en control con diagnóstico de prehipertensión-normal |
| P1000008 | Población en control con diagnóstico de prediabetes-obeso |
| P1000009 | Población en control con diagnóstico de prediabetes-sobrepeso |
| P1000010 | Población en control con diagnóstico de prediabetes-normal |
| P1000011 | Población en control con perímetro de cintura aumentado-obeso |
| P1000012 | Población en control con perímetro de cintura aumentado-sobrepeso |
| P1000013 | Población en control con perímetro de cintura aumentado-normal |

Sección B: población con controles realizados

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P1000014 | Población en control número de personas en pvs-segundo control realizado |
| P1000015 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado |
| P1000016 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-evaluación nutricional- mejoraron su diagnóstico nutricional integrado o z score de peso/talla |
| P1000017 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-evaluación nutricional- mejoraron su diagnóstico nutricional o z score de IMC |
| P1000018 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-evaluación nutricional- mantienen su peso inicial |
| P1000019 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-evaluación nutricional- bajan su peso inicial en un 5% o más |
| P1000020 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-evaluación nutricional- bajan su peso inicial menos de un 5% |
| P1000021 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-evaluación nutricional- mejoran su perímetro de cintura |
| P1000022 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-evaluación nutricional- recuperan su peso pregestacional |
| P1000023 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-evaluación nutricional- disminuyen su índice de masa corporal (IMC) |
| P1000024 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-condición física- mejoraron su capacidad funcional |
| P1000025 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-condición física- mejoraron su capacidad muscular |
| P1000026 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado-condición física- mejoraron capacidad motora |

| | |
|-----------------|---|
| P1000027 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado- condición física- asisten al 60% o más de las sesiones del programa |
| P1000028 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado- evaluación metabólica- disminuyen niveles de glicemia |
| P1000029 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado- evaluación metabólica- disminuyen niveles de colesterol (ldl) |
| P1000030 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado- evaluación metabólica- disminuyen niveles de triglicéridos |
| P1000031 | Población en control número de personas en pvs-tercer control realizado- evaluación metabólica- disminuyen niveles de presión arterial |
| P1000032 | Población en control número de personas en pvs-cuarto control realizado |
| P1000033 | Población en control número de personas en pvs- cuarto control realizado-evaluación nutricional- mejoraron su diagnóstico nutricional integrado o z score de peso/talla |
| P1000034 | Población en control número de personas en pvs- cuarto control realizado-evaluación nutricional- mejoraron su diagnóstico nutricional o z score de IMC |
| P1000035 | Población en control número de personas en pvs- cuarto control realizado-evaluación nutricional- mantienen su peso inicial |
| P1000036 | Población en control número de personas en pvs- cuarto control realizado-evaluación nutricional- bajan su peso inicial en un 5% o más |
| P1000037 | Población en control número de personas en pvs- cuarto control realizado-evaluación nutricional- bajan su peso inicial menos de un 5% |
| P1000038 | Población en control número de personas en pvs- cuarto control realizado-evaluación nutricional- mejoran su perímetro de cintura |
| P1000039 | Población en control número de personas en pvs- cuarto control realizado-evaluación nutricional- recuperan su peso pregestacional |
| P1000040 | Población en control número de personas en pvs- cuarto control realizado-evaluación nutricional- disminuyen su índice de masa corporal (IMC) |

| | |
|-----------------|---|
| P1000041 | Población en control número de personas en pvs-quinto control realizado |
| P1000042 | Población en control número de personas en pvs- quinto control realizado-evaluación nutricional- mejoraron su diagnóstico nutricional integrado o z score de peso/talla |
| P1000043 | Población en control número de personas en pvs- quinto control realizado-evaluación nutricional- mejoraron su diagnóstico nutricional o z score de IMC |
| P1000044 | Población en control número de personas en pvs- quinto control realizado-evaluación nutricional- mantienen su peso inicial |
| P1000045 | Población en control número de personas en pvs- quinto control realizado-evaluación nutricional- bajan su peso inicial en un 5% o más |
| P1000046 | Población en control número de personas en pvs- quinto control realizado-evaluación nutricional- bajan su peso inicial menos de un 5% |
| P1000047 | Población en control número de personas en pvs- quinto control realizado-evaluación nutricional- mejoran su perímetro de cintura |
| P1000048 | Población en control número de personas en pvs- quinto control realizado-evaluación nutricional- recuperan su peso pregestacional |
| P1000049 | Población en control número de personas en pvs- quinto control realizado-evaluación nutricional- disminuyen su índice de masa corporal (IMC) |
| P1000050 | Población en control número de personas en pvs-quinto control realizado-condición física- mejoraron su capacidad funcional |
| P1000051 | Población en control número de personas en pvs-quinto control realizado-condición física- mejoraron su capacidad muscular |
| P1000052 | Población en control número de personas en pvs-quinto control realizado-condición física- mejoraron capacidad motora |
| P1000053 | Población en control número de personas en pvs-quinto control realizado-condición física- asisten al 60% o más de las sesiones del programa |

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, no se dispone de datos relativos a población inmigrante.

P11: Programa de infecciones de transmisión sexual - VIH / SIDA

El programa de infecciones de transmisión sexual - VIH / SIDA, está compuesto por 2 secciones, distribuidas según las siguientes prestaciones:

Sección A: población en control del programa de VIH/SIDA (Uso exclusivo Centros de Atención VIH-SIDA)

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P1100110 | Población en control del programa de VIH/SIDA (Uso exclusivo Centros de Atención VIH-SIDA)-nº total de personas con VIH / SIDA |
| P1100120 | Población en control del programa de VIH/SIDA (Uso exclusivo Centros de Atención VIH-SIDA)-nº de personas VIH / SIDA con TARV |
| P1100130 | Población en control del programa de VIH/SIDA (Uso exclusivo Centros de Atención VIH-SIDA)-nº de personas VIH / SIDA sin tarv |

Sección B: población en control por comercio sexual (Uso exclusivo de Unidades Control Comercio Sexual)

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P1100140 | Población en control por comercio sexual (Uso exclusivo de Unidades Control Comercio Sexual)-nº de personas / comercio sexual |

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos relativos a población inmigrante para ambas secciones.

Sección A: población en control del programa de VIH/SIDA (Uso exclusivo Centros de Atención VIH-SIDA)

De acuerdo a los registros REM 2015, existen 606 personas migrantes internacionales con VIH y SIDA, contra más de 23 mil personas nacidas en Chile (*Tabla 22.1*), de las cuales 521 están con terapia antiretroviral y 85 sin terapia antiretroviral.

El análisis estratificado por región del país indica que existen 55 casos en la segunda región, 11 casos en la V, 7 casos en la VIII, 521 en la RM y 11 en la XV región (*Tabla 22.2*). Las tablas del Anexo 14.1 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile la población en control del programa de VIH y SIDA.

Tabla 22.1 Población en control del programa de VIH y SIDA. Total País, año 2015.

| Concepto | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------|---------|
| Nº de personas con VIH/SIDA | 606 | 100,00% | 23433 | 100,00% | 24039 | |
| Nº de personas VIH/SIDA con TARV | 521 | 85,97% | 20826 | 88,87% | 21347 | 0.0254 |
| Nº de personas VIH/SIDA sin TARV | 85 | 14,03% | 2607 | 11,13% | 2692 | 0.0254 |

Elaboración propia.

Sección B: población en control por comercio sexual (Uso exclusivo de Unidades Control Comercio Sexual)

Los registros de estadísticas mensuales indican que el Chile el 2015 hubo 824 mujeres en atención de control por comercio sexual y que eran migrantes internacionales, comparado con 2933 de mujeres de origen chileno (Ver *Tabla 23.1*).

Tabla 23.1 Población en control por comercio sexual. Total País y por región, año 2015.

| Región | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------|---------|
| 1 | 0 | 0,00% | 79 | 2,69% | 79 | 0.0000 |
| 2 | 145 | 17,60% | 117 | 3,99% | 262 | 0.0000 |
| 3 | 110 | 13,35% | 73 | 2,49% | 183 | 0.0000 |
| 4 | 93 | 11,29% | 145 | 4,94% | 238 | 0.0000 |
| 5 | 10 | 1,21% | 281 | 9,58% | 291 | 0.0000 |
| 6 | 17 | 2,06% | 443 | 15,10% | 460 | 0.0000 |
| 7 | 0 | 0,00% | 365 | 12,44% | 365 | 0.0000 |
| 8 | 37 | 4,49% | 442 | 15,07% | 479 | 0.0000 |
| 9 | 1 | 0,12% | 172 | 5,86% | 173 | 0.0000 |
| 10 | 45 | 5,46% | 145 | 4,94% | 190 | 0.5492 |
| 11 | 22 | 2,67% | 83 | 2,83% | 105 | 0.8056 |
| 12 | 304 | 36,89% | 180 | 6,14% | 484 | 0.0000 |
| 13 | 40 | 4,85% | 393 | 13,40% | 433 | 0.0001 |
| 14 | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% | 3 | 0.3584 |
| 15 | 0 | 0,00% | 12 | 0,41% | 12 | 0.0659 |
| Total general | 824 | 100,00% | 2933 | 100,00% | 3757 | |

Elaboración propia.

P12: Programa Cobertura de Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer de mama (Semestral)

El programa Cobertura de Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer de mama (Semestral), está compuesto por 5 secciones, distribuidas según las siguientes prestaciones:

Sección A: programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP vigente

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P1207150 | Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP vigente-Menor de 25 años |
| P1206010 | Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP vigente-25 a 29 años |
| P1206020 | Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP vigente-30 a 34 años |
| P1206030 | Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP vigente-35 a 39 años |
| P1206040 | Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP vigente-40 a 44 años |
| P1206050 | Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP vigente-45 a 49 años |
| P1206060 | Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP vigente-50 a 54 años |
| P1206070 | Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP vigente-55 a 59 años |
| P1206080 | Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP vigente-60 a 64 años |
| P1207160 | Programa de cáncer de cuello uterino: población femenina con PAP vigente-65 y más años |

Sección B.1: programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados e informados según resultados (Examen realizados en la red pública)

| Código | Prestación |
|-----------------|---|
| P1207170 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - Menor de 15 años |
| P1207010 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 15 a 19 años |
| P1207020 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 20 a 24 años |
| P1208020 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 25 a 29 años |
| P1208030 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado 30 a 34 años |
| P1208040 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 35 a 39 años |
| P1208050 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 40 a 44 años |
| P1208060 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 45 a 49 años |
| P1208070 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 50 a 54 años |
| P1208080 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 55 a 59 años |
| P1208090 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 60 a 64 años |
| P1208100 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 65 y más años |

Sección B.2: programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados e informados según resultados (Examen realizados en extrasistema)

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P1220091 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado- Menor de 15 años |
| P1220092 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 15 a 19 años |
| P1220093 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 20 a 24 años |
| P1220094 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 25 a 29 años |
| P1220095 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado 30 a 34 años |
| P1220096 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 35 a 39 años |
| P1220097 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 40 a 44 años |
| P1220098 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 45 a 49 años |
| P1220099 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 50 a 54 años |
| P1220100 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 55 a 59 años |
| P1220101 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 60 a 64 años |
| P1220102 | Programa de cáncer de cuello uterino: PAP realizados según resultado - 65 y más años |

Sección C: programa de cáncer de mama: mujeres con mamografía vigente en los últimos 3 años

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P1207190 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías vigentes en los últimos 3 años-Menor de 35 años |
| P1220020 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías vigentes en los últimos 3 años -35 a 49 años |
| P1220030 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías vigentes en los últimos 3 años -50 a 54 años |
| P1207030 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías vigentes en los últimos 3 años -55 a 59 años |
| P1207040 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías vigentes en los últimos 3 años -60 a 64 años |
| P1207050 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías vigentes en los últimos 3 años -65 a 69 años |
| P1207060 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías vigentes en los últimos 3 años -70 a 74 años |
| P1207070 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías vigentes en los últimos 3 años -75 a 79 años |
| P1207080 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con mamografías vigentes en los últimos 3 años -80 y más años |

Sección D: programa de cáncer de mama: número de mujeres con examen físico de mama (vigente)

| Código | Prestación |
|-----------------|--|
| P1207180 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de mamas (vigente)-Menor de 35 años |

| | |
|-----------------|---|
| P1220070 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de mamas (vigente)-35 a 49 años |
| P1220090 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de mamas (vigente)-50 a 54 años |
| P1207090 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de mamas (vigente)-55 a 59 años |
| P1207100 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de mamas (vigente)-60 a 64 años |
| P1207110 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de mamas (vigente)-65 a 69 años |
| P1207120 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de mamas (vigente)-70 a 74 años |
| P1207130 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de mamas (vigente)-75 a 79 años |
| P1207140 | Programa cáncer de mama, número de mujeres con examen físico de mamas (vigente)-80 y más años |

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, no se dispone de datos relativos a población inmigrante.



RESULTADOS 2016



P1: Programa de Salud de la Mujer

De acuerdo a la información registrada en cada una de estas secciones, se dispone de datos relativos a población inmigrante solo para las secciones A y B, por lo que los resúmenes entregados solo corresponderán a estas secciones.

Sección A: Población en control según método de regulación de fertilidad.

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, corresponde a las personas que se atienden en el Programa de Regulación de Fertilidad, en establecimientos con nivel primario de atención, según los siguientes métodos anticonceptivos: Dispositivo Intrauterino de cobre y Dispositivo Intrauterino Medicado P1010100, Hormonal (Oral combinado P1010201 y progestágeno P1010202, Inyectable combinado P1010203 y progestágeno P1010508 e Implante P1040500) y Preservativo (Mujer P1010301 y Hombre P1010302). También se registra el número de mujeres en control que padecen enfermedad cardiovascular (DM-HTA) P1060010, el número de mujeres con retiro de implante anticipado (antes de los 3 años) P1060020 y las personas con método de regulación de fertilidad más preservativo P1060090.

La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en este programa se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 67,79% (21663). La segunda región con más atenciones concentra un 13,28% (4243) y corresponde a la Región 2, seguida por la Región 1 con una concentración del 7,39% (2362) del total de atenciones de inmigrantes para este programa.

Tabla 1. Distribución de población inmigrante atendida en el Programa de Regulación de la Fertilidad. 2016.

| Región | Total Inmigrantes | % Inmigrantes |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2362 | 7,39% |
| 2 | 4243 | 13,28% |
| 3 | 981 | 3,07% |
| 4 | 305 | 0,95% |
| 5 | 308 | 0,96% |
| 6 | 87 | 0,27% |
| 7 | 10 | 0,03% |
| 8 | 142 | 0,44% |
| 9 | 186 | 0,58% |
| 10 | 231 | 0,72% |
| 11 | 140 | 0,44% |
| 12 | 125 | 0,39% |
| 13 | 21663 | 67,79% |
| 14 | 105 | 0,33% |
| 15 | 1067 | 3,34% |
| Total Inmigrantes | 31955 | 100% |

Elaboración propia.

Tabla 2. Población inmigrante y de chilenos en control según método de regulación de fertilidad, total país, año 2016.

| Método | Población Inmigrantes | % Inmigrantes | Población Chilenos | % Chilenos | Total General | p-value |
|--|-----------------------|---------------|--------------------|------------|----------------|---------|
| D.I.U | 3304 | 11,11% | 344425 | 22,74% | 347729 | 0,0000 |
| H.O combinado | 4927 | 16,56% | 409208 | 27,02% | 414135 | 0,0000 |
| H.O progestágeno | 2631 | 8,84% | 134403 | 8,87% | 137034 | 0,8481 |
| H.I. combinado | 6405 | 21,53% | 226466 | 14,95% | 232871 | 0,0000 |
| Preservativo mujer | 1669 | 5,61% | 53882 | 3,56% | 55551 | 0,0000 |
| Preservativo hombres | 42 | 0,14% | 9232 | 0,61% | 9274 | 0,0000 |
| H. implante | 4551 | 15,30% | 182894 | 12,08% | 187445 | 0,0000 |
| H.I. progestágeno | 6223 | 20,92% | 153891 | 10,16% | 160114 | 0,0000 |
| Mujeres en control que padecen enfermedad Cardiovascular (DMHTA) | 731 | 2,46% | 61012 | 4,03% | 61743 | 0,0000 |
| Mujeres con retiro de Implante Anticipado en el semestre (antes de los 3 años) | 110 | 0,37% | 5458 | 0,36% | 5568 | 0,7906 |
| Método de Regulación de Fertilidad más Preservativo | 1362 | 4,58% | 46314 | 3,06% | 47676 | 0,0000 |
| Total general | 31955 | | 1627185 | | 1659140 | |

Elaboración propia.



Organización Internacional para las Migraciones
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración



En la *Tabla 2* destaca que la mayoría de los métodos de regulación de fertilidad muestran diferencias significativas en cuanto a la proporción de inmigrantes y de chilenos, solo en el método de control Hormonal Oral Progestágeno P1010202 (8,84% población inmigrante y 8,87% población chilena) no se muestra con diferencias significativas.

También es posible observar que el método de regulación más utilizado en la población inmigrante es el Hormonal inyectable combinado (21,53%) seguido del Hormonal inyectable progestágeno (20,92%) y por el Hormonal Oral Combinado (18,51%), mientras que en la población chilena el más frecuente es el Hormonal Oral Combinado (27,02%), seguido por el Dispositivo Intrauterino (22,74%) y el Hormonal Inyectable Combinado (14,95%). Este último el más utilizado por la población inmigrante.

Considerando las diferencias observadas a nivel país, se realizó este mismo análisis para cada una de las regiones. Las tablas del Anexo 1.2 muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y chilena controlada en cada uno de los métodos de regulación de fertilidad.



Sección B: Gestantes en control con riesgo psicosocial

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, corresponde a las gestantes que han sido controladas por su embarazo, control realizado por médico gineco-obstetra o matrona, y que han sido evaluadas con aplicación de la Pauta de Evaluación Psicosocial Abreviada, según la norma, con obtención de resultado con o sin riesgo psicosocial.

Las gestantes controladas se muestran según grupo de edad: P1020100 (Menos de 15 años), P1020200 (15 a 19 años), P1040501 (20 a 24 años), P1060100 (25 a 29 años), P1060101 (30 a 34 años), P1060102 (35 a 39 años), P1060103 (40 a 44 años), P1060104 (45 a 49 años) y P1060105 (50 a 54 años).

La mayor concentración gestantes inmigrantes en control con riesgo psicosocial se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 63,07% (3726). La segunda región con más atenciones concentra un 13,73% (811) y corresponde a la Región 2, seguida por la Región 1 con una concentración del 10,70% (632) del total.

Tabla 4. Distribución de Gestantes Inmigrantes en Control con Riesgo Psicosocial. 2016.

| Región | Total Inmigrantes | % Inmigrantes |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 632 | 10,70% |
| 2 | 811 | 13,73% |
| 3 | 89 | 1,51% |
| 4 | 108 | 1,83% |
| 5 | 143 | 2,42% |
| 6 | 43 | 0,73% |
| 7 | 22 | 0,37% |
| 8 | 47 | 0,80% |
| 9 | 23 | 0,39% |
| 10 | 18 | 0,30% |
| 11 | 6 | 0,10% |
| 12 | 13 | 0,22% |
| 13 | 3726 | 63,07% |
| 14 | 5 | 0,08% |
| 15 | 222 | 3,76% |
| Total Inmigrantes | 5908 | 100% |

Elaboración propia.

Tabla 5. Población de gestantes inmigrantes y chilenos con riesgo psicosocial, según Rango etario, total país, año 2016.

| Grupos de edad | Población Inmigrantes | % Inmigrantes | Población Chilena | % Chilenos | Total General | p-value |
|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------|
| Menos de 15 años | 7 | 0,12% | 418 | 0,49% | 425 | 0,0000 |
| 15 a 19 años | 382 | 6,47% | 10502 | 12,41% | 10884 | 0,0000 |
| 20 a 24 años | 1595 | 27,00% | 22216 | 26,26% | 23811 | 0,2148 |
| 25 a 29 años | 1791 | 30,31% | 23442 | 27,71% | 25233 | 0,0000 |
| 30 a 34 años | 1276 | 21,60% | 16447 | 19,44% | 17723 | 0,0001 |
| 35 a 39 años | 687 | 11,63% | 8963 | 10,60% | 9650 | 0,0129 |
| 40 a 44 años | 165 | 2,79% | 2498 | 2,95% | 2663 | 0,4813 |
| 45 a 49 años | 5 | 0,08% | 107 | 0,13% | 112 | 0,3763 |
| Total general | 5908 | 100,00% | 84593 | 100,00% | 90501 | |

Elaboración propia.

En la *Tabla 5*, destaca que la mayoría de las gestantes migrantes y chilenas muestran diferencias significativas entre sí, salvo en las gestantes con edades comprendidas entre los 20 a 24 años, de 40 a 44 y de 45 a 49 años. En migrantes se observa la mitad del embarazo adolescente (de 15 a 19 años) que hay en los chilenos en riesgo psicosocial (6% y 12% respectivamente).

También es posible observar que la mayor cantidad (30.31%) de gestantes inmigrantes con riesgo social tienen entre 25 a 29 años, seguidas por jóvenes entre 20 y 24 años (27,00%) y personas de 30 a 34 años (21.00%). La proporción etaria de la población chilena con mayor cantidad de gestantes en riesgo psicosocial es la misma a migrante, centrándose en los grupos de 25 a 29 años (27,71%), 20 a 24 (26,26%), y 30 a 34 años (19,44%).

Considerando las diferencias observadas a nivel país, se realizó este mismo análisis para cada una de las regiones. Las tablas a continuación muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y chilena con riesgo social. El Anexo 3.1 describe la población de gestantes inmigrantes y chilenos con riesgo psicosocial, según Rango etario para cada una de las regiones de Chile.

P2: Programa de Salud del Niño

Se dispone de datos relativos a población inmigrante solo para la sección A.

Sección A: Población en control según estado nutricional

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, y para la cual existe información relativa a la población inmigrante, corresponde a la población infantil de niños (as) menores de 9 años que se encuentran bajo control en establecimientos con nivel primario de atención, y que han sido evaluados según su estado nutricional, de acuerdo a la norma vigente y los indicadores peso/edad, peso/talla, talla/edad, por desviaciones estándar y diagnóstico de Estado Nutricional Integrado: normal, riesgo de desnutrir, desnutrido, sobrepeso, obeso y desnutridos secundarios.

La clasificación del Diagnóstico Nutricional Integrado para niños(as) de 6 a 9 años es bajo peso, riesgo de obesidad, obeso y normal.

La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en este programa se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 62,79% (4280). La segunda región con más atenciones concentra un 12,71% (866) y corresponde a la Región 2, seguida de la región 1 con una concentración de un 9,79% (667), del total de atenciones de inmigrantes para este programa.

Tabla 7. Distribución de población inmigrante atendida en el Programa de Salud del Niño. 2016.

| Región | Hombres Inmigrantes | % | Mujeres Inmigrantes | % | Total Inmigrantes | % Inmigrantes |
|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 323 | 48,42% | 344 | 51,57% | 667 | 9,79% |
| 2 | 406 | 48,60% | 110 | 51,40% | 866 | 12,71% |
| 3 | 114 | 48,10% | 123 | 51,90% | 237 | 3,48% |
| 4 | 54 | 50,00% | 54 | 50,00% | 108 | 1,58% |
| 5 | 52 | 52,53% | 47 | 47,47% | 99 | 1,45% |
| 6 | 27 | 57,45% | 20 | 42,55% | 47 | 0,69% |
| 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% | 7 | 0,10% |
| 8 | 14 | 51,85% | 13 | 48,15% | 27 | 0,40% |
| 9 | 19 | 43,18% | 25 | 56,82% | 44 | 0,65% |
| 10 | 30 | 54,55% | 25 | 45,45% | 55 | 0,81% |
| 11 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% | 10 | 0,15% |
| 12 | 8 | 57,14% | 6 | 42,86% | 14 | 0,21% |
| 13 | 2121 | 49,56% | 2159 | 50,44% | 4280 | 62,79% |
| 14 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
| 15 | 186 | 54,39% | 156 | 45,61% | 342 | 5,02% |
| Total Inmigrantes | 3374 | 49,50% | 3443 | 50,50% | 6816 | 100,00% |

Elaboración propia.

Tabla 8. Población de hombres inmigrantes y de chilenos en control según estado nutricional, total país, año 2016

| | Indicador Nutricional y Parámetro de Medición | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de Hombres | p-value |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Diagnóstico Nutricional Integrado | Riesgo/Bajo peso | 131 | 3,88% | 15699 | 2,74% | 15830 | 0,0000 |
| | Desnutrido | 29 | 0,86% | 1941 | 0,34% | 1970 | 0,0000 |
| | Sobre peso/Riesgo obesidad | 613 | 18,17% | 127017 | 22,13% | 127630 | 0,0000 |
| | Obeso | 285 | 8,45% | 74723 | 13,02% | 75008 | 0,0000 |
| | Normal | 2320 | 68,76% | 349950 | 60,97% | 352270 | 0,0000 |
| | Desnutrición secundaria | 21 | 0,62% | 115 | 0,02% | 136 | 0,0000 |
| Indicador peso/edad | -1 D.S | 216 | 6,40% | 21064 | 3,67% | 21280 | 0,0000 |
| | -2 D.S. | 24 | 0,71% | 2654 | 0,46% | 2678 | 0,0339 |
| Indicador peso/talla | +2 D.S | 231 | 6,85% | 54993 | 9,58% | 55224 | 0,0000 |
| | +1 D.S. | 515 | 15,26% | 109359 | 19,05% | 109874 | 0,0000 |
| | -1 D.S. | 136 | 4,03% | 13040 | 2,27% | 13176 | 0,0000 |
| | -2 D.S. | 32 | 0,95% | 1648 | 0,29% | 1680 | 0,0000 |
| Indicador talla/edad | -1 D.S. | 405 | 12,00% | 55020 | 9,59% | 55425 | 0,0000 |
| | -2 D.S. | 94 | 2,79% | 10155 | 1,77% | 10249 | 0,0000 |
| | Total de niños en control | 3374 | 100,00% | 573974 | 100,00% | 577348 | |

Elaboración propia.



En la *Tabla 8*, se puede visualizar que de los niños a los que se ha efectuado un Diagnóstico Nutricional Integrado, muestran diferencias significativas en cuanto a la proporción de inmigrantes y de chilenos en todos los diagnósticos.

También es posible observar que la mayor parte de los niños inmigrantes (68,76%) tiene un Diagnóstico Nutricional Integrado de Normal, seguido de aquellos que son diagnosticados Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad (18.17%).

En la población chilena, el diagnóstico es bastante similar, puesto que la mayoría de los niños (60.97%) son diagnosticados como Normal, seguido de aquellos niños que son diagnosticados con Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad (22.13%). A pesar de que en ambas poblaciones la mayoría de los niños tienen un diagnóstico Nutricional Normal, se presentan diferencias significativas entre niños chilenos y niños migrantes.

Es importante mencionar que el total de niños en control (tanto chilenos, como inmigrantes), debe corresponder a la suma de todos los diagnósticos nutricionales, sin embargo, el total de casos de niños inmigrantes con diagnóstico es del 100.74%, sobrando un 0.74% de niños; en el caso de los niños chilenos el 99.22% tiene un diagnóstico, faltando un 0.78%, lo que podría deberse a errores de registro.

Tabla 9. Población de mujeres inmigrantes y de chilenas en control según estado nutricional, total país, año 2016.*

| | Indicador Nutricional y Parámetro de Medición | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Diagnóstico Nutricional Integrado | Riesgo/Bajo peso | 133 | 3,86% | 13140 | 2,37% | 13273 | 0,0000 |
| | Desnutrido | 17 | 0,49% | 1479 | 0,27% | 1496 | 0,0104 |
| | Sobre peso/Riesgo obesidad | 663 | 19,26% | 124368 | 22,46% | 125031 | 0,0000 |
| | Obeso | 279 | 8,11% | 68308 | 12,33% | 68587 | 0,0000 |
| | Normal | 2370 | 68,86% | 341844 | 61,73% | 344214 | 0,0000 |
| | Desnutrición secundaria | 13 | 0,38% | 92 | 0,02% | 105 | 0,0000 |
| Indicador peso/edad | -1 D.S | 214 | 6,22% | 17207 | 3,11% | 17421 | 0,0000 |
| | -2 D.S. | 23 | 0,67% | 2021 | 0,36% | 2044 | 0,0033 |
| Indicador peso/talla | +2 D.S | 216 | 6,28% | 49866 | 9,00% | 50082 | 0,0000 |
| | +1 D.S. | 530 | 15,40% | 106397 | 19,21% | 106927 | 0,0000 |
| | -1 D.S. | 140 | 4,07% | 10870 | 1,96% | 11010 | 0,0000 |
| | -2 D.S. | 17 | 0,49% | 1244 | 0,22% | 1261 | 0,0009 |
| Indicador talla/edad | -1 D.S. | 373 | 10,84% | 49040 | 8,86% | 49413 | 0,0000 |
| | -2 D.S. | 73 | 2,12% | 7847 | 1,42% | 7920 | 0,0005 |
| | Total de niños en control | 3442 | 100,00% | 553787 | 100,00% | 557229 | |

* Posibles errores de registro de origen ya han sido documentado a DEIS previo a la entrega de este reporte.

Elaboración propia.

En la *Tabla 9*, se puede visualizar que de las niñas a los que se ha efectuado un Diagnóstico Nutricional Integrado, muestran diferencias significativas en cuanto a la proporción de inmigrantes y de chilenas en todos los diagnósticos.

También es posible observar que la mayor parte de las niñas inmigrantes (68,86%) tiene un Diagnóstico Nutricional Integrado de Normal, seguido de aquellas que son diagnosticadas con Sobre Peso o en Riesgo de Obesidad (19,26%).



Organización Internacional para las Migraciones
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración



En la población chilena, el diagnóstico es bastante similar, puesto que la mayoría de las niñas (61,73%) son diagnosticadas como Normal, seguido de aquellas niñas que son diagnosticadas con Sobre Peso o en Riego de Obesidad (22,46%). A pesar de que en ambas poblaciones la mayoría de las niñas tienen un diagnóstico Nutricional Normal, se presentan diferencias significativas entre niños chilenas y niñas migrantes.

Es importante mencionar que el total de niñas en control (tanto chilenas, como inmigrantes) debe corresponder a la suma de todos los diagnósticos nutricionales. Sin embargo, el total de casos de niñas inmigrantes con diagnóstico es del 100,96%, sobrando 0,96% de niñas; en el caso de las niñas chilenas el 99,18% tiene un diagnóstico, faltando un 0.82%, tal como se describe al pie de la tabla 9.

Considerando las diferencias observadas a nivel país, se realizó este mismo análisis para cada una de las regiones.

Las tablas a continuación muestran la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y chilena con un Diagnóstico Nutricional Integrado. Las tablas del Anexo 5.2 describen resultados para cada una de las regiones de la población de hombres y mujeres inmigrantes y de chilenos en control según estado nutricional.

P3: Control de otros Programas

Se dispone de datos relativos a población inmigrante solo para la sección A.

Sección A: Existencia de población en control

El total de la Población Bajo Control que se registra en estas estadísticas, corresponde al número total de personas que se encuentran bajo control en el establecimiento por los distintos programas de salud a la fecha de corte. Se debe considerar el registro por patologías y/o condiciones, es decir, si un paciente padece asma bronquial y artrosis de cadera y rodilla, se debe registrar ambas patologías.

La mayor concentración de inmigrantes que se atienden en estos programas se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 67% (2405) en hombres y 69% (1031) en mujeres migrantes internacionales. La segunda región con más atenciones concentra un 13% en hombres y corresponde a la Región séptima, y en mujeres concentra un 12% y también es la séptima región.

Tabla 11. Distribución de población inmigrante de Otros programas. 2016

| Región | Total Hombres Inmigrantes | % Hombres Inmigrantes | Total Mujeres Inmigrantes | % Mujeres Inmigrantes | Total Inmigrantes | % Inmigrantes |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 30 | 0,84% | 20 | 1,34% | 50 | 0,99% |
| 2 | 76 | 2,13% | 23 | 1,54% | 99 | 1,96% |
| 3 | 20 | 0,56% | 3 | 0,20% | 23 | 0,46% |
| 4 | 9 | 0,25% | 1 | 0,07% | 10 | 0,20% |
| 5 | 18 | 0,51% | 19 | 1,27% | 37 | 0,73% |
| 6 | 42 | 1,18% | 41 | 2,75% | 83 | 1,64% |
| 7 | 480 | 13,48% | 135 | 9,04% | 615 | 12,17% |
| 8 | 30 | 0,84% | 23 | 1,54% | 53 | 1,05% |
| 9 | 49 | 1,38% | 41 | 2,75% | 90 | 1,78% |
| 10 | 163 | 4,58% | 81 | 5,43% | 244 | 4,83% |
| 11 | 7 | 0,20% | 1 | 0,07% | 8 | 0,16% |
| 12 | 7 | 0,20% | 1 | 0,07% | 8 | 0,16% |
| 13 | 2405 | 67,54% | 1031 | 69,06% | 3436 | 67,99% |
| 14 | 63 | 1,77% | 6 | 0,40% | 69 | 1,37% |
| 15 | 162 | 4,55% | 67 | 4,49% | 229 | 4,53% |
| Total general | 3561 | | 1493 | | 5054 | |

Elaboración propia.

Tabla 11.1 Población de hombres inmigrantes y de chilenos en control de otros programas, Total país, año 2016.

| | Programa | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|---|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente | Leve | 9 | 0,65% | 12613 | 3,91% | 12622 | 0,0000 |
| | Moderado | 27 | 1,95% | 19690 | 6,10% | 19717 | 0,0000 |
| | Severo | 1 | 0,07% | 859 | 0,27% | 860 | 0,1617 |
| Asma bronquial | Leve | 285 | 20,59% | 48763 | 15,11% | 49048 | 0,0000 |
| | Moderado | 125 | 9,03% | 44585 | 13,82% | 44710 | 0,0000 |
| | Severo | 29 | 2,10% | 4432 | 1,37% | 4461 | 0,0214 |
| Enfermedad Pulmonar Obstructiva (EPOC) | Tipo A | 435 | 31,43% | 37328 | 11,57% | 37763 | 0,0000 |
| | Tipo B | 77 | 5,56% | 8272 | 2,56% | 8349 | 0,0000 |
| | Otras respiratorias crónicas | 35 | 2,53% | 12319 | 3,82% | 12354 | 0,0125 |
| | Oxígeno dependiente | 27 | 1,95% | 2414 | 0,75% | 2441 | 0,0000 |
| | Asistencia ventilatoria no invasiva o invasiva | 1 | 0,07% | 302 | 0,09% | 303 | 0,7955 |
| | Fibrosis quística | 0 | 0,00% | 308 | 0,10% | 308 | 0,2502 |
| | Epilepsia | 51 | 3,68% | 24778 | 7,68% | 24829 | 0,0000 |
| | Enfermedad de Parkinson | 12 | 0,87% | 9140 | 2,83% | 9152 | 0,0000 |
| | Artrosis de cadera y rodilla | 170 | 12,28% | 59146 | 18,33% | 59316 | 0,0000 |
| | Alivio del dolor | 4 | 0,29% | 4931 | 1,53% | 4935 | 0,0002 |
| | Hipotiroidismo | 96 | 6,94% | 32804 | 10,17% | 32900 | 0,0001 |
| | Total general | 1384 | 100,00% | 322684 | 100,00% | 324068 | |
| Dependencia Severa | Dependencia leve | 46 | 59,74% | 12451 | 34,13% | 12497 | 0,0000 |
| | Dependencia moderada | 9 | 11,69% | 5481 | 15,02% | 5490 | 0,4130 |
| | Oncológica | 2 | 2,60% | 1420 | 3,89% | 1422 | 0,5571 |
| | No oncológica | 20 | 25,97% | 17129 | 46,95% | 17149 | 0,0002 |

| | | | | | | | |
|--|--|----|--------|-------|--------|-------|--------|
| | Con escasas | 3 | 13,64% | 1776 | 9,57% | 1779 | 0,5177 |
| | Total | 77 | | 36481 | | 36558 | |
| | Total personas | 14 | | 16890 | 65,81% | 16904 | |
| | Total personas con escasas | 3 | 21,43% | 1603 | 9,49% | 1606 | 0,1278 |
| Atención domiciliaria por dependencia severa | Total personas con cuidador que recibe apoyo monetario | 12 | 85,71% | 7173 | 42,47% | 7185 | 0,0011 |

Elaboración propia.



La patología más frecuente en control por otras patologías en los hombres inmigrantes a nivel país (Tabla 11.1), es el Asma Bronquial, particularmente en su estadio Leve (20.59%), seguida de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Tipo A (31.43%), presentando ambas patologías incluso una proporción mayor a la población chilena.

Es importante añadir que, a nivel global, la mayoría de las patologías muestran diferencias significativas entre la proporción de hombres inmigrantes y chilenos, salvo en aquellos donde hay muy poco reporte de dichas enfermedades en población migrante.

Con respecto a la distribución de aquellos hombres con algún tipo de dependencia según el índice de Barthel, la Dependencia Leve es la más frecuente en hombres inmigrantes (59.74%), cifra mayor a la presentada en hombres chilenos (34.13%), diferencia estadísticamente significativa. La dependencia más prevalente en hombres chilenos es la Dependencia Severa no Oncológica (46.95%).

Para aquellas personas beneficiadas con el Programa de Atención Domiciliaria por Dependencia Severa, se observan diferencias significativas en la proporción de Personas con cuidador que reciben apoyo monetario.

Para el caso de las mujeres inmigrantes a nivel país (Tabla 11.2), también es el Asma Bronquial la patología respiratoria más frecuente, particularmente en su estadio Leve (23.22%), seguida de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Tipo A (17.36%), presentando ambas patologías incluso una proporción mayor a la población chilena, diferencia estadísticamente significativa.

Con respecto a la distribución de aquellas mujeres con algún tipo de dependencia según el índice de Barthel, la Dependencia Leve es la más frecuente en mujeres inmigrantes (58.97%), cifra mayor a la presentada en mujeres chilenas (38.12%), diferencia estadísticamente significativa. La dependencia más reportada en mujeres chilenas es la Dependencia Severa no Oncológica (43.39%).

Para aquellas personas beneficiadas con el Programa de Atención Domiciliaria por Dependencia Severa, se observan diferencias significativas tanto en las personas con escaras como en la proporción de personas con cuidador que recibe apoyo monetario. El Anexo 6.2 detalla la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y chilena en control de otros programas

Tabla 11.2 Población de mujeres inmigrantes y de chilenas en control de otros programas. Total país, año 2016.

| | Programa | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
|---|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente | Leve | 5 | 0,15% | 9282 | 1,32% | 9287 | 0,0000 |
| | Moderado | 15 | 0,44% | 14069 | 2,00% | 14084 | 0,0000 |
| | Severo | 0 | 0,00% | 534 | 0,08% | 534 | NA |
| Asma bronquial | Leve | 787 | 23,20% | 88435 | 12,56% | 89222 | 0,0000 |
| | Moderado | 326 | 9,61% | 65119 | 9,25% | 65445 | 0,4649 |
| | Severo | 79 | 2,33% | 8525 | 1,21% | 8604 | 0,0000 |
| Enfermedad Pulmonar Obstructiva (EPOC) | Tipo A | 589 | 17,36% | 47108 | 6,69% | 47697 | 0,0000 |
| | Tipo B | 59 | 1,74% | 8340 | 1,18% | 8399 | 0,0029 |
| | Otras respiratorias crónicas | 89 | 2,62% | 20271 | 2,88% | 20360 | 0,3764 |
| | Oxígeno dependiente | 37 | 1,09% | 3265 | 0,46% | 3302 | 0,0000 |
| | Asistencia ventilatoria no invasiva o invasiva | 0 | 0,00% | 290 | 0,04% | 290 | NA |
| | Fibrosis quística | 0 | 0,00% | 312 | 0,04% | 312 | NA |
| | Epilepsia | 59 | 1,74% | 25254 | 3,59% | 25313 | 0,0000 |
| | Enfermedad de Parkinson | 15 | 0,44% | 9205 | 1,31% | 9220 | 0,0000 |
| | Artrosis de cadera y rodilla | 510 | 15,04% | 186266 | 26,45% | 186776 | 0,0000 |
| | Alivio del dolor | 4 | 0,12% | 7034 | 1,00% | 7038 | 0,0000 |
| | Hipotiroidismo | 818 | 24,12% | 210953 | 29,95% | 211771 | 0,0000 |
| | Total general | 3392 | 100,00% | 704262 | 100,00% | 707654 | |
| Dependencia Severa | Dependencia leve | 69 | 58,97% | 23865 | 38,12% | 23934 | 0,0000 |
| | Dependencia moderada | 17 | 14,53% | 9831 | 15,70% | 9848 | 0,3359 |
| | Oncológica | 4 | 3,42% | 1746 | 2,79% | 1750 | 0,8667 |
| | No oncológica | 27 | 23,08% | 27166 | 43,39% | 27193 | 0,0000 |
| | Con escaras | 8 | 25,81% | 2699 | 9,34% | 2707 | 0,0016 |



| | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | 117 | | 62608 | | 62725 | |
| | Total personas | 19 | | 26241 | | 26260 | |
| | Total personas con escasas | 9 | 47,37% | 2406 | 9,17% | 2415 | 0,0000 |
| Atención domiciliaria por dependencia severa | Total personas con cuidador que recibe apoyo monetario | 16 | 84,21% | 9590 | 36,55% | 9606 | 0,0000 |

Elaboración propia.



P4: Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)

Se dispone de datos relativos a población inmigrante solo para la sección A y B.

Sección A: Programa Salud Cardiovascular (PSCV)

En esta sección se registra el número de personas en control de PSCV, clasificados según riesgo cardiovascular (bajo, moderado, alto), según patología y factores de riesgo (hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, tabaquismo, antecedentes de infarto al miocardio (IAM), antecedentes de enfermedades cerebro vascular (ACV). Además, se registra el número de personas en PSCV que se les ha aplicado la pauta de detección de enfermedad renal crónica.

El “Número de personas en PSCV” representa la población total que se encuentra bajo control en el Programa en el establecimiento, dado que independiente de su problema de salud o condición, es clasificada según riesgo cardiovascular que puede ser bajo, moderado o alto. El total país alcanza a 9434 migrantes, de los cuales en un 31.07%, de las cuales mayoritariamente son mujeres (68.92%). La mayor concentración de inmigrantes que se atiende en el Programa de Salud Cardiovascular se encuentra en la Región Metropolitana (Región 13), ascendiendo al 69.45% (6552). La segunda región con más atenciones concentra un 8.54% (806) y corresponde a la Región V, seguida de la región I con una concentración de un 6.44% (608), del total de prestaciones utilizadas por la población inmigrante.

Tabla 13. Población de inmigrantes en control en el Programa de Salud Cardiovascular. Total país, año 2016.

| Región | Hombres Inmigrantes | % | Mujeres Inmigrantes | % | Total Inmigrantes | % Inmigrantes |
|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 1 | 187 | 6,38 | 421 | 6,47 | 608 | 6,44 |
| 2 | 75 | 2,59 | 220 | 3,38 | 295 | 3,13 |
| 3 | 52 | 1,77 | 118 | 1,81 | 170 | 1,80 |
| 4 | 91 | 3,10 | 134 | 2,06 | 225 | 2,38 |
| 5 | 50 | 1,70 | 756 | 11,63 | 806 | 8,54 |
| 6 | 3 | 0,10 | 6 | 0,09 | 9 | 0,09 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 55 | 1,88 | 105 | 1,61 | 160 | 1,70 |
| 9 | 123 | 4,20 | 228 | 3,50 | 351 | 3,72 |
| 10 | 57 | 1,94 | 86 | 1,32 | 143 | 1,52 |
| 11 | 3 | 0,10 | 13 | 0,99 | 16 | 0,170 |
| 12 | 33 | 1,13 | 33 | 0,51 | 66 | 0,70 |
| 13 | 2139 | 72,98 | 4213 | 64,79 | 6552 | 69,45 |
| 14 | 9 | 0,31 | 25 | 0,38 | 34 | 0,36 |
| 15 | 54 | 1,84 | 145 | 2,23 | 199 | 2,1 |
| Total Inmigrantes | 2931 | 31,07 | 6503 | 68,92 | 9434 | 100 |

Elaboración propia.

Tabla 13.1 Población de hombres inmigrantes y de chilenos en el Programa de Salud Cardiovascular. Total país, año 2016.*

| Concepto | | Total Hombres Inmigrantes | % Hombres Inmigrantes | Total Hombres Chilenos | % Hombres Chilenos | Total Hombres | p-value |
|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Personas en control PSCV | | 2931 | | 1626355,29 | | 1629286,29 | |
| Clasificación del riesgo cardiovascular | Bajo | 753 | 25,69% | 260850 | 16,04% | 261603 | |
| | Moderado | 788 | 26,89% | 510162 | 31,37% | 510950 | |
| | Alto | 1390 | 47,42% | 856565 | 52,67% | 857955 | |
| Personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) | Hipertensos | 2232 | 76,15% | 1334437 | 82,05% | 1336669 | |
| | Diabéticos | 1355 | 46,23% | 627804 | 38,60% | 629159 | |
| | Dislipidémicos | 1523 | 51,96% | 695654 | 42,77% | 697177 | |
| | Tabaquismo \geq 55 años | 367 | 12,52% | 142634 | 8,77% | 143001 | |
| | Antecedentes IAM | 105 | 3,58% | 65819 | 4,05% | 65924 | |
| | Antecedentes ECV | 153 | 5,22% | 76879 | 4,73% | 77032 | |
| Detección y prevención de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) | Sin enfermedad Renal | 1981 | 67,59% | 586203 | 36,04% | 588184 | |
| | Etapa G1 y G2 (VFG \geq 60 ml/min) | 492 | 16,79% | 270865 | 16,65% | 271357 | |
| | Etapa G3a (VFG \geq 45 a 59 ml/min) | 91 | 3,10% | 80477 | 4,95% | 80568 | |
| | Etapa G3b (VFG \geq 45 a 59 ml/min) | 56 | 1,91% | 28522 | 1,75% | 28578 | |
| | Etapa G4 (VFG \geq 30 a 44 ml/min) | 8 | 0,27% | 9584 | 0,59% | 9592 | |
| | Etapa G5 (VFG $<$ 15 ml/min) | 13 | 0,44% | 4717 | 0,29% | 4730 | |

*No se estimaron valores p por existir decimal en el recuento total de casos para ambas poblaciones en estudio. Esto fue documentado a DEIS Minsal antes de la elaboración de este reporte. Elaboración propia.



Organización Internacional para las Migraciones
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración



La información mostrada en la tabla 13.1, corresponde a los hombres chilenos e inmigrantes en control en el programa de Salud Cardiovascular a nivel país.

Del total de 2931 hombres inmigrantes en este programa, la mayoría (47.42%) se clasifican riesgo cardiovascular alto. En el caso de hombres chilenos, la situación es bastante similar, puesto que la mayoría (52.67%) también se clasifican con riesgo cardiovascular alto. Esta diferencia es significativa.

Con respecto a las personas bajo control según patología y existencia de factores de riesgo, en el caso de los hombres inmigrantes, se puede observar que la mayoría (76.15%) presenta diagnóstico de hipertensión, distribución similar a la población chilena. Destaca también que la proporción de hombres migrantes fumadores con edad mayor o igual a 55 años es mayor a la de la población chilena (12.52 v/s 8.77%).

En la detección y prevención de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), se puede identificar que la mayoría de los hombres inmigrantes (67.59%), no tienen enfermedad renal, cifra que prácticamente duplica a la población de hombres chilenos, donde el 36.04% no muestra esta enfermedad. La diferencia de las proporciones de hombres inmigrantes y de chilenos con respecto a aquellos que no tienen esta enfermedad es significativa.

Tabla 13.2 Población de mujeres inmigrantes y de chilenas en el Programa de Salud Cardiovascular. Total país, año 2016.

| Concepto | | Total Mujeres Inmigrantes | % Mujeres Inmigrantes | Total Mujeres Chilenas | % Mujeres Chilenas | Total Mujeres | p-value |
|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------|
| Personas en control PSCV | | 6503 | | 2803372,571 | | 2809875,571 | |
| Clasificación del riesgo cardiovascular | Bajo | 2059 | 31,66% | 564212 | 20,13% | 566271 | |
| | Moderado | 1831 | 28,16% | 993072,089 | 35,42% | 994903,089 | |
| | Alto | 2613 | 40,18% | 1248477 | 44,53% | 1251090 | |
| Personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) | Hipertensos | 4801 | 73,83% | 2262984,654 | 80,72% | 2267785,654 | |
| | Diabéticos | 2475 | 38,06% | 989048 | 35,28% | 991523 | |
| | Dislipidémicos | 3746 | 57,60% | 1386213 | 49,45% | 1389959 | |
| | Tabaquismo \geq 55 años | 590 | 9,07% | 192543 | 6,87% | 193133 | |
| | Antecedentes IAM | 108 | 1,66% | 55600 | 1,98% | 55708 | |
| | Antecedentes ECV | 217 | 3,34% | 78043 | 2,78% | 78260 | |
| Detección y prevención de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) | Sin enfermedad Renal | 3531 | 54,30% | 1013081 | 36,14% | 1016612 | |
| | Etapa G1 y G2 (VFG \geq 60 ml/min) | 825 | 12,69% | 459481 | 16,39% | 460306 | |
| | Etapa G3a (VFG \geq 45 a 59 ml/min) | 206 | 3,17% | 150127 | 5,36% | 150333 | |
| | Etapa G3b (VFG \geq 45 a 59 ml/min) | 101 | 1,55% | 57832 | 2,06% | 57933 | |
| | Etapa G4 (VFG \geq 30 a 44 ml/min) | 38 | 0,58% | 18260 | 0,65% | 18298 | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----|-------|------|-------|------|--|
| | Etapa G5 (VFG <15 ml/min) | 13 | 0,20% | 5554 | 0,20% | 5567 | |
|--|---------------------------------|----|-------|------|-------|------|--|

*No se estimaron valores p por existir decimal en el recuento total de casos para ambas poblaciones en estudio. Esto fue documentado a DEIS Minsal antes de la elaboración de este reporte. Elaboración propia.

La información mostrada en la tabla 13.2, corresponde a mujeres chilenas e inmigrantes en control en el programa de Salud Cardiovascular a nivel país.

Del total de 6503 mujeres inmigrantes en este programa, la mayoría (40.18%) se clasifican con riesgo cardiovascular alto, distribución similar a la proporción de mujeres chilenas en la misma condición (44.53%). Para ambas clasificaciones la diferencia entre mujeres inmigrantes y chilenas es significativa.

Con respecto a las personas bajo control según patología y existencia de factores de riesgo, en el caso de las mujeres inmigrantes, se puede observar que la mayoría (73.83%) son hipertensas, patología también mayoritaria en las mujeres chilenas (80.72%).

Respecto a la distribución de factores de riesgo en la población de mujeres, destaca que el consumo de tabaco en edad mayor o igual a 55 años es mayor en mujeres migrantes que chilenas (57.6% v/s 49.45%).

En la detección y prevención de la progresión de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), al igual que en los hombres, la mayoría de las mujeres inmigrantes (54.30%), no tienen enfermedad renal, mientras que, en la población de mujeres chilenas, el 36.14% no muestra esta enfermedad. La diferencia de las proporciones de mujeres inmigrantes y de chilenas con respecto a aquellas que no tienen esta enfermedad es significativa.

El Anexo 7.2 presenta la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y chilena en el Programa de Salud Cardiovascular

Sección B: Metas de Compensación

En esta sección corresponde registrar el número de personas en control de PSCV, que tienen compensadas sus patologías.

El número de personas con Presión Arterial menor a 140/90 mmHg, están contenidas en el total de hipertensos, por lo tanto, debe ser menor o igual al total del número de personas con diagnóstico de Hipertensión.

El número de personas en control, con examen de Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) menor a 7% están contenidas en el total de diabéticos, por lo tanto, debe ser menor o igual al total del número de personas con diagnóstico Diabetes Mellitus.

El número de personas en control, con examen de Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) menor a 7%, y presión arterial menor a 140/90 mmHg y Colesterol LDL menor a 100 mg/dL están contenidas en el total de diabéticos, por lo tanto, debe ser menor o igual al total del número de personas con diagnóstico Diabetes Mellitus.

El número de personas en control, no diabéticas, con riesgo cardiovascular Alto con colesterol LDL menor a 100 mg/dl., debe ser menor o igual al número total de personas con riesgo cardiovascular Alto de la sección A.

El número de personas en control, con antecedentes de enfermedad cardiovascular en tratamiento con ácido acetilsalicílico, debe ser menor o igual al número total de personas con antecedentes de infarto (IAM) y enfermedad cerebro vascular (AVC) de la sección A.

El número de personas en control, con antecedentes de enfermedad cardiovascular en tratamiento con estatinas, debe ser menor o igual al número total de personas con antecedentes de infarto (IAM) y enfermedad cerebro vascular (AVC) de la sección A.

Tabla 15.1 Población de hombres inmigrantes y de chilenos en el Programa de Salud Cardiovascular con patologías compensadas. Total País, año 2016.

| Concepto | | Total Hombres Inmigrantes Metas | Total Hombres Inmigrantes | % Hombres Inmigrantes Metas | Total Hombres chilenos Metas | Total Hombres chilenos | % Hombres chilenos Metas | Total Hombres Metas | Total Hombres | % Hombres Metas | p-value |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------|
| Personas bajo control por Hipertensión | PA < 140/90 mmHg | 1320 | 2232 | 59,14% | 830832 | 1334437 | 62,26% | 832152 | 1336669 | 62,26% | 0.0458 |
| Personas bajo control por Diabetes Mellitus | HbA1C<7% | 588 | 1355 | 43,39% | 266642 | 627804 | 42,47% | 267230 | 629159 | 42,47% | 0.4925 |
| | HbA1C<7% PA < 140/90mmHg y Colesterol LDL < 100 mg/dl | 284 | 1355 | 20,96% | 96420 | 627804 | 15,36% | 96704 | 629159 | 15,37% | 0.0412 |
| Personas bajo control en riesgo CV alto | COLESTEROL LDL < 100 mg/dL | 624 | 1390 | 44,89% | 260018 | 856565 | 30,36% | 260642 | 857955 | 30,38% | 0.0325 |
| Personas bajo control con antecedentes de Enfermedad Cardiovascular (ECV) | En tratamiento con Ácido Acetilsalicílico | 70 | 134 | 52,24% | 72408 | 142666 | 50,75% | 72478 | 142800 | 50,75% | 0.7310 |
| | En tratamiento con Estatina | 64 | 134 | 47,76% | 70258 | 142666 | 49,25% | 70322 | 142800 | 49,25% | 0.7310 |

Elaboración propia.

Como se puede observar en la Tabla 15.1, a nivel país, existe una mayor proporción de hombres chilenos en control por hipertensión y normotensos (62.26%) comparado con misma población en personas migrantes internacionales (59.14%). Respecto a las personas bajo control por Diabetes Mellitus, la población migrante internacionales presentaría mejores indicadores de compensación que la población chilena, vale decir, respecto del valor de hemoglobina glicosilada (43.39 v/s 42.47%). Además, es mayor la proporción de población migrante que reporta LDL menor a 100 mg/dL (44.89%) comparado con hombres chilenos (30.36%).

Tabla 15.2 Población de mujeres inmigrantes y de chilenos en el Programa de Salud Cardiovascular con patologías compensadas. Total país, año 2016.*

| Concepto | | Total Mujeres Inmigrantes Metas | Total Mujeres Inmigrantes | % Mujeres Inmigrantes Metas | Total Mujeres chilenas Metas | Total Mujeres chilenas | % Mujeres chilenas Metas | Total Mujeres Metas | Total Mujeres | % Mujeres Metas | p-value |
|---|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------|
| Personas bajo control por Hipertensión | PA < 140/90 mmHg | 3081 | 4801 | 64,17% | 1510914 | 2262984,654 | 66,77% | 1513995 | 2267785,654 | 66,76% | |
| Personas bajo control por Diabetes Mellitus | HbA1C<7% | 1143 | 2475 | 46,18% | 449615 | 989048 | 45,46% | 450758 | 991523 | 45,46% | |
| | HbA1C<7% PA < 140/90mmHg y Colesterol LDL < 100 mg/dl | 542 | 2475 | 21,90% | 153172 | 989048 | 15,49% | 153714 | 991523 | 15,50% | |
| Personas bajo control en riesgo CV alto | COLESTEROL LDL < 100 mg/dL | 778 | 2613 | 29,77% | 353726 | 1248477 | 28,33% | 354504 | 1251090 | 28,34% | |
| Personas bajo control con antecedentes de Enfermedad Cardiovascular (ECV) | En tratamiento con Ácido Acetilsalicílico | 116 | 229 | 50,66% | 62351 | 125348 | 49,74% | 62467 | 125577 | 49,74% | |
| | En tratamiento con Estatina | 113 | 229 | 49,34% | 62997 | 125348 | 50,26% | 63110 | 125577 | 50,26% | |

*No se estimaron valores p por existir decimal en el recuento total de casos para ambas poblaciones en estudio. Esto fue documentado a DEIS Minsal antes de la elaboración de este reporte. Elaboración propia.

Como se puede observar en la Tabla 15.2, a nivel país, existe una mayor proporción de mujeres chilenas en control por hipertensión y normotensas (66.77%) comparado con misma población en personas migrantes internacionales (64.17%). Respecto a las personas bajo control por Diabetes Mellitus, la población migrante internacionales presentaría mejores niveles de hemoglobina glicosilada (46.18% v/s 45.46%). Además, es mayor la proporción de población migrante que reporta LDL menor a 100 mg/dL (29.77%) comparado con mujeres chilenas (28.33%).

Al Anexo 8.2 describe la distribución para cada una de las regiones de Chile de la población inmigrante y chilena en el Programa de Salud Cardiovascular con patologías compensadas

P5: Programa de Salud del Adulto Mayor

Se dispone de datos relativos a población inmigrante para las secciones A, A.1 y B.

Sección A: población en control por condición de funcionalidad

Para el total del país (Tabla 16.1), se observan diferencias significativas entre migrantes internacionales y locales, hombres y mujeres por separado, respecto a la funcionalidad. Para el caso de los hombres inmigrantes, se observa una mayor proporción de personas autovalentes con riesgo (51.99%) comparado con población chilena (46.61%).

Para el caso de las mujeres, se repite esta distribución, donde mujeres inmigrantes presentan en una mayor proporción de personas autovalentes con riesgo (45.06%) comparado con población chilena (40.95%).

Respecto al grado de dependencia, los hombres inmigrantes presentarían en mayor proporción dependencia leve (10.88%) que la población chilena en la misma condición (7.67%). Misma distribución ocurriría en mujeres migrantes con dependencia leve (14.03%) comparado con chilenas en la misma condición (9.10%).

Tabla 16.1 Población de personas inmigrantes y chilenas en control por condición de funcionalidad. Total país por sexo, año 2016.

| Condición de funcionalidad | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Autovalente con riesgo | 535 | 51,99% | 303425 | 46,61% | 303960 | 0.0452 |
| Autovalente sin riesgo | 232 | 22,55% | 175091 | 26,90% | 175323 | 0.5247 |
| Riesgo de dependencia | 115 | 11,18% | 88410 | 13,58% | 88525 | 0.6412 |
| Subtotal (EFAM) | 882 | | 566926 | | 567808 | |
| Dependiente leve | 112 | 10,88% | 49910 | 7,67% | 50022 | 0.2487 |
| Dependiente moderado | 18 | 1,75% | 12886 | 1,98% | 12904 | 0.5960 |
| Dependiente grave | 7 | 0,68% | 9626 | 1,48% | 9633 | 0.7412 |
| Dependiente total | 10 | 0,97% | 11571 | 1,78% | 11581 | 0.0505 |
| Subtotal (Indice Barthel) | 147 | | 83993 | | 84140 | |
| Total general | 1029 | | 650919 | | 651948 | |
| Condición de funcionalidad | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
| Autovalente con riesgo | 771 | 45,06% | 420820 | 40,95% | 421591 | 0.2541 |
| Autovalente sin riesgo | 408 | 23,85% | 288335 | 28,06% | 288743 | 0.6251 |
| Riesgo de dependencia | 229 | 13,38% | 159668 | 15,54% | 159897 | 0.3246 |
| Subtotal (EFAM) | 1408 | | 868823 | | 870231 | |
| Dependiente leve | 240 | 14,03% | 93533 | 9,10% | 93773 | 0.0895 |
| Dependiente moderado | 28 | 1,64% | 23808 | 2,32% | 23836 | 0.0616 |
| Dependiente grave | 13 | 0,76% | 18309 | 1,78% | 18322 | 0.3245 |
| Dependiente total | 22 | 1,29% | 23188 | 2,26% | 23210 | 0.5123 |
| Subtotal (Indice Barthel) | 303 | | 158838 | | 159141 | |
| Total general | 1711 | | 1027661 | | 1029372 | |

Elaboración propia.

El Anexo 9.2 presenta la distribución para cada una de las regiones de Chile de las personas inmigrantes y chilenas en control por condición de funcionalidad. Dada la escasa cantidad de personas inmigrantes, no se realizará análisis estratificado comparativo por región.

Sección A: existencia de población en control en programa "más adultos mayores autovalentes" por condición de funcionalidad

Existen escasos datos de población migrante internacional en control de programa más adultos autovalentes por condición de funcionalidad, tal y como aparece en la *Tabla 17.1*. Similar a la sección anterior, en población local la mayoría de los asistentes a control son del tipo autovalente con riesgo, tanto en hombres como mujeres.

En Anexo 10.2 se presentan tablas consecutivas de datos de esta prestación para el año 2016 por región y sexo, que no serán comentadas en detalle por sus escasos datos disponibles. Por esta misma razón, la columna de valor p de comparación tampoco será completada, al no tener pertinencia real de interpretación.

Tabla 17.1 Población en control en programa "más adultos mayores autovalentes" por condición de funcionalidad. Total País por sexo, año 2016.

| Condición de funcionalidad | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Autovalente con riesgo | 7 | 70,00% | 21013 | 57,64% | 21020 | |
| Autovalente sin riesgo | 2 | 20,00% | 10502 | 28,81% | 10504 | |
| Riesgo de dependencia | 1 | 10,00% | 4938 | 13,55% | 4939 | |
| Total | 10 | 1,13% | 36453 | 6,43% | 36463 | |
| Total (EFAM) | 882 | | 566926 | | 567808 | |
| Condición de funcionalidad | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
| Autovalente con riesgo | 26 | 70,27% | 71725 | 58,62% | 71751 | |
| Autovalente sin riesgo | 8 | 21,62% | 36805 | 30,08% | 36813 | |
| Riesgo de dependencia | 3 | 8,11% | 13831 | 11,30% | 13834 | |
| Total | 37 | 2,63% | 122361 | 14,08% | 122398 | |
| Total (EFAM) | 1408 | | 868823 | | 870231 | |

Elaboración propia.

Sección B: población bajo control por estado nutricional

Continuando con el análisis de la sección de prestaciones del adulto mayor, se observa que la mayor proporción de población inmigrante bajo control por estado nutricional se encuentra en estado normal, tanto para hombres como para mujeres (42.22% hombres y 37.47% mujeres, respectivamente). Mayor detalle se puede apreciar en la *Tabla 18.1*.

Tabla 18.1 Salud del Adulto Mayor (P5), Sección B: población bajo control por estado nutricional. Total País por sexo, año 2016.

| Estado nutricional | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Bajo peso | 101 | 9,35% | 70323 | 10,18% | 70424 | 0.3707 |
| Normal | 456 | 42,22% | 281845 | 40,78% | 282301 | 0.3365 |
| Sobrepeso | 336 | 31,11% | 213083 | 30,83% | 213419 | 0.8436 |
| Obeso | 187 | 17,31% | 125820 | 18,21% | 126007 | 0.4480 |
| Total | 1080 | | 691071 | | 692151 | |
| Estado nutricional | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
| Bajo peso | 151 | 9,10% | 112687 | 10,35% | 112838 | 0.0928 |
| Normal | 622 | 37,47% | 363924 | 33,44% | 364546 | ** |
| Sobrepeso | 486 | 29,28% | 305773 | 28,10% | 306259 | 0.2847 |
| Obeso | 401 | 24,16% | 305935 | 28,11% | 306336 | ** |
| Total | 1660 | | 1088319 | | 1089979 | |

Elaboración propia.

En Anexo 11.2 se presenta la población de personas inmigrantes y chilenas bajo control por estado nutricional según región de origen. Dada la escasa cantidad de personas inmigrantes, no se realizará análisis estratificado comparativo por región.

P6: Programa de Salud mental en atención primaria y especialidad

Se dispone de datos relativos a población inmigrante para la sección A.1 Y B.1

Sección A.1: población en control en APS al corte

Para el año 2016, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 762 hombres migrantes y 1182 mujeres migrantes en control de APS por salud mental en todo el país. Esto comparado con 197394 hombres chilenos y 465668 mujeres chilenas en el mismo control. Para los hombres, los valores relativos sugieren mayor proporción de hombres migrantes agresores que hombres chilenos, pero los valores absolutos son muy bajos como para una interpretación más amplia y formal de estos resultados.

Las tablas del Anexo 12.2 dan cuenta de los valores absolutos y relativos de estos casos por región del país. La mayoría de los casos presenta menos de 5 casos por región con lo que la estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia, con la excepción de RM que tiene un poco más de casos. No obstante, todas las tablas se detallan para conocimiento y completitud de la información.

Tabla 19.1 Población en control en atención primaria en salud mental al corte. Total País por sexo, año 2016.

| Concepto | | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Número de personas en control en el programa | | 762 | 100,00% | 197394 | 100,00% | 198156 | |
| Violencia de género | Víctima | 13 | 1,71% | 3399 | 1,72% | 3412 | 0,9731 |
| | Agresor | 18 | 2,36% | 3977 | 2,01% | 3995 | 0,4958 |
| | Abuso sexual | 3 | 0,39% | 425 | 0,22% | 428 | 0,2897 |
| Concepto | | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
| Número de personas en control en el programa | | 1182 | 100,00% | 465668 | 100,00% | 466850 | 0.0000 |
| Violencia de género | Víctima | 220 | 18,61% | 27558 | 5,92% | 27778 | 0.0000 |
| | Agresor | 33 | 2,79% | 1393 | 0,30% | 1426 | 0.0000 |
| | Abuso sexual | 22 | 1,86% | 1426 | 0,31% | 1448 | 0.0000 |

Elaboración propia.

Para el año 2016, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 288 hombres migrantes y 959 mujeres migrantes en control de APS con diagnóstico de trastornos mentales en todo el país. Al mismo tiempo, había 186845 hombres chilenos y 435301 mujeres chilenas en control por la misma causa.

En hombres migrantes los tres principales diagnósticos son trastornos ansiosos, Otros trastornos del comportamiento de las emociones de comienzo habitual en la infancia y en la adolescencia, trastornos hipercinéticos y depresión leve. En mujeres migrantes el trastorno ansioso, otras y la depresión moderada son los problemas más reportados.

Las tablas presentadas en Anexo 13.2 dan cuenta de los valores absolutos y relativos de estos casos por región del país. La mayoría de los casos presenta menos de 5 casos por región con lo que la estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia, con la excepción de RM que tiene un poco más de casos. No obstante, todas las tablas se detallan para conocimiento y completitud de la información.

Tabla 20.1 Población en control en atención primaria en salud mental al corte. Total País Hombres, año 2016.

| Concepto | | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Personas con diagnósticos de trastornos mentales | | 288 | 100,00% | 186845 | 100,00% | 187133 | |
| Trastornos del Humor (Afectivos) | Depresión leve | 22 | 7,64% | 11247 | 6,02% | 11269 | 0,2483 |
| | Depresión moderada | 17 | 5,90% | 19091 | 10,22% | 19108 | 0,0157 |
| | Depresión grave | 1 | 0,35% | 3367 | 1,80% | 3368 | 0,0635 |
| | Depresión post parto | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | |
| | Trastorno bipolar | 3 | 1,04% | 673 | 0,36% | 676 | 0,0541 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo de sustancias psicotrópicas | Consumo perjudicial o dependencia de alcohol | 30 | 10,42% | 17421 | 9,32% | 17451 | 0,5239 |
| | Consumo perjudicial o dependencia como droga principal | 6 | 2,08% | 7550 | 4,04% | 7556 | 0,0917 |
| | Policonsumo | 11 | 3,82% | 7427 | 3,97% | 7438 | 0,8926 |
| Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | Trastorno hipercinético | 33 | 11,46% | 27810 | 14,88% | 27843 | 0,1026 |
| | Trastorno disocial desafiante y opositor | 2 | 0,69% | 1621 | 0,87% | 1623 | 0,7515 |
| | Trastorno de ansiedad de separación en la infancia | 2 | 0,69% | 780 | 0,42% | 782 | 0,4665 |
| | Otros trastornos del comportamiento de las emociones de comienzo habitual en la | 72 | 25,00% | 34340 | 18,38% | 34412 | 0,0038 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|-------|--------|-------|--------|
| | infancia y en la adolescencia | | | | | | |
| | Trastornos de ansiedad | 107 | 37,15% | 47037 | 25,17% | 47144 | 0,0000 |
| | Alzheimer y otras demencias | 2 | 0,69% | 2226 | 1,19% | 2228 | 0,4372 |
| | Trastornos conductuales asociados a demencia | 1 | 0,35% | 391 | 0,21% | 392 | 0,6089 |
| | Esquizofrenia | 3 | 1,04% | 2181 | 1,17% | 2184 | 0,8428 |
| | Primer episodio de esquizofrenia con ocupación regular | 1 | 0,35% | 75 | 0,04% | 76 | 0,0098 |
| | Trastornos de la conducta alimentaria | 2 | 0,69% | 792 | 0,42% | 794 | 0,4803 |
| | Retraso mental | 0 | 0,00% | 3348 | 1,79% | 3348 | NA |
| | Trastorno de personalidad | 7 | 2,43% | 4945 | 2,65% | 4952 | 0,8195 |
| | Trastornos generalizados del desarrollo | 2 | 0,69% | 1950 | 1,04% | 1952 | 0,5600 |
| | Otras | 36 | 12,50% | 7268 | 3,89% | 7304 | 0,0000 |

Elaboración propia.

Tabla 20.2 Población en control en atención primaria en salud mental al corte. Total País Mujeres, año 2015.

| Concepto | | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Personas con diagnósticos de trastornos mentales | | 959 | 100,00% | 435301 | 100,00% | 436260 | |
| Trastornos del Humor (Afectivos) | Depresión leve | 153 | 15,95% | 56469 | 12,97% | 56622 | 0,0061 |
| | Depresión moderada | 219 | 22,84% | 114494 | 26,30% | 114713 | 0,0149 |
| | Depresión grave | 20 | 2,09% | 12265 | 2,82% | 12285 | 0,1710 |
| | Depresión post parto | 19 | 1,98% | 2907 | 0,67% | 2926 | 0,0000 |
| | Trastorno bipolar | 2 | 0,21% | 1919 | 0,44% | 1921 | 0,2778 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo de sustancias psicotrópicas | Consumo perjudicial o dependencia de alcohol | 12 | 1,25% | 4865 | 1,12% | 4877 | 0,6941 |
| | Consumo perjudicial o dependencia como droga principal | 6 | 0,63% | 4371 | 1,00% | 4377 | 0,2401 |
| | Policonsumo | 5 | 0,52% | 2569 | 0,59% | 2574 | 0,7811 |
| Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | Trastorno hipercinético | 12 | 1,25% | 10260 | 2,36% | 10272 | 0,0241 |
| | Trastorno disocial desafiante y opositor | 0 | 0,00% | 875 | 0,20% | 875 | NA |
| | Trastorno de ansiedad de separación en la infancia | 2 | 0,21% | 768 | 0,18% | 770 | 0,8129 |
| | Otros trastornos del comportamiento de las emociones de comienzo habitual en la | 54 | 5,63% | 31314 | 7,19% | 31368 | 0,0613 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | infancia y en la adolescencia | | | | | | |
| | Trastornos de ansiedad | 704 | 73,41% | 173829 | 39,93% | 174533 | 0,0000 |
| | Alzheimer y otras demencias | 1 | 0,10% | 4310 | 0,99% | 4311 | 0,0056 |
| | Trastornos conductuales asociados a demencia | 0 | 0,00% | 456 | 0,10% | 456 | NA |
| | Esquizofrenia | 2 | 0,21% | 2675 | 0,61% | 2677 | 0,1078 |
| | Primer episodio de esquizofrenia con ocupación regular | 0 | 0,00% | 60 | 0,01% | 60 | NA |
| | Trastornos de la conducta alimentaria | 3 | 0,31% | 3002 | 0,69% | 3005 | 0,1587 |
| | Retraso mental | 3 | 0,31% | 4116 | 0,95% | 4119 | 0,0430 |
| | Trastorno de personalidad | 34 | 3,55% | 21944 | 5,04% | 21978 | 0,0344 |
| | Trastornos generalizados del desarrollo | 2 | 0,21% | 1424 | 0,33% | 1426 | 0,5205 |
| | Otras | 289 | 30,14% | 17470 | 4,01% | 17759 | 0,0000 |

Elaboración propia.

Sección B.1: población en control en especialidad al corte

Para el año 2016, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 23 hombres migrantes y 24 mujeres migrantes en control de especialidad por salud mental en todo el país. De estos, la mayoría en RM. Para las mujeres, los valores relativos sugieren mayor proporción de mujeres migrantes y chilenas víctimas comparado con los hombres.

La mayoría de los casos presenta escasos casos por región con lo que la estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia. Por esta razón, la descripción de cada una de las regiones para esta sección se omitió, a excepción de RM que concentra la mayoría de los casos.

Tabla 21.1 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total País por sexo, año 2016.

| Concepto | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Número de personas en control en el programa | 23 | 100,00% | 65246 | 100,00% | 65269 | |
| Víctima | 1 | 4,35% | 1003 | 1,54% | 1004 | 0.2735 |
| Agresor | 1 | 4,35% | 1783 | 2,73% | 1784 | 0.6348 |
| Abuso sexual | 1 | 4,35% | 128 | 0,20% | 129 | 0.0000 |
| Concepto | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
| Número de personas en control en el programa | 24 | 100,00% | 77614 | 100,00% | 77638 | |
| Víctima | 4 | 16,67% | 3097 | 3,99% | 3101 | 0.0015 |
| Agresor | 1 | 4,17% | 960 | 1,24% | 961 | 0.1943 |
| Abuso sexual | 1 | 4,17% | 247 | 0,32% | 248 | 0.0008 |

Elaboración propia.

Tabla 21.2 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total RM por sexo, año 2016.

| Concepto | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Número de personas en control en el programa | 23 | 100,00% | 38271 | 100,00% | 38294 | |
| Víctima | 1 | 4,35% | 854 | 2,23% | 855 | 0.4922 |
| Agresor | 1 | 4,35% | 1386 | 3,62% | 1387 | 0.8522 |
| Abuso sexual | 1 | 4,35% | 94 | 0,25% | 95 | 0.0001 |
| Concepto | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
| Número de personas en control en el programa | 20 | 100,00% | 41460 | 100,00% | 41480 | |
| Víctima | 4 | 20,00% | 2546 | 6,14% | 2550 | 0.0099 |
| Agresor | 1 | 5,00% | 751 | 1,81% | 752 | 0.2853 |
| Abuso sexual | 1 | 5,00% | 144 | 0,35% | 145 | 0.0004 |

Elaboración propia.

Para el año 2016, de acuerdo a registros REM del Ministerio de salud, había 6 hombres migrantes y 4 mujeres migrantes en control de especialidad con diagnóstico de trastornos mentales en todo el país. En hombres el principal diagnóstico es trastornos ansiosos. En mujeres el trastorno ansioso es el problema más reportado.

Las tablas presentadas en Anexo 14.2 dan cuenta de los valores absolutos y relativos de estos casos por región del país. La mayoría de los casos presenta menos de 5 casos por región con lo que la estimación de comparación entre migrantes y chilenos pierde relevancia y pertinencia, con la excepción de RM que tiene un poco más de casos.

Tabla 20.1 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total País Hombres, año 2016.

| Concepto | | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Personas con diagnósticos de trastornos mentales | | 23 | 100,00% | 52163 | 100,00% | 52186 | |
| Trastornos del Humor (Afectivos) | Depresión refractaria | 0 | 0,00% | 1485 | 2,85% | 1485 | NA |
| | Depresión grave con psicosis | 0 | 0,00% | 2062 | 3,95% | 2062 | NA |
| | Depresión con alto riesgo suicida | 0 | 0,00% | 1209 | 2,32% | 1209 | NA |
| | Depresión post parto | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | NA |
| | Trastorno bipolar | 3 | 13,04% | 2637 | 5,06% | 2640 | 0.0805 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo de sustancias psicotrópicas | Consumo perjudicial o dependencia de alcohol | 3 | 13,04% | 3566 | 6,84% | 3569 | 0.2384 |
| | Consumo perjudicial o dependencia como droga principal | 3 | 13,04% | 3019 | 5,79% | 3022 | 0.1364 |
| | Policonsumo | 4 | 17,39% | 4932 | 9,45% | 4936 | 0.1935 |
| Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | Trastorno hiperactivo | 5 | 21,74% | 9407 | 18,03% | 9412 | 0.6440 |
| | Trastorno disocial desafiante y oposicionista | 0 | 0,00% | 1041 | 2,00% | 1041 | NA |
| | Trastorno de ansiedad de separación en la infancia | 0 | 0,00% | 119 | 0,23% | 119 | NA |
| | Otros trastornos del comportamiento de las emociones de comienzo habitual | 4 | 17,39% | 6665 | 12,78% | 6669 | 0.5076 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--------|------|--------|------|--------|
| | en la infancia y en la adolescencia | | | | | | |
| | Trastornos de ansiedad | 5 | 21,74% | 7643 | 14,65% | 7648 | 0.3366 |
| | Alzheimer y otras demencias | 0 | 0,00% | 2244 | 4,30% | 2244 | NA |
| | Trastornos conductuales asociados a demencia | 0 | 0,00% | 355 | 0,68% | 355 | NA |
| | Esquizofrenia | 2 | 8,70% | 8319 | 15,95% | 8321 | 0.3422 |
| | Primer episodio de esquizofrenia con ocupación regular | 0 | 0,00% | 612 | 1,17% | 612 | NA |
| | Trastornos de la conducta alimentaria | 0 | 0,00% | 83 | 0,16% | 83 | NA |
| | Retraso mental | 0 | 0,00% | 2484 | 4,76% | 2484 | NA |
| | Trastorno de personalidad | 0 | 0,00% | 2512 | 4,82% | 2512 | |
| | Trastornos generalizados del desarrollo | 1 | 4,35% | 3250 | 6,23% | 3251 | 0.7088 |
| | Otras | 8 | 34,78% | 1406 | 2,70% | 1414 | 0.0000 |

Elaboración propia.

Tabla 20.2 Población en control en especialidad en salud mental al corte. Total País Mujeres, año 2016.

| Concepto | | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Personas con diagnósticos de trastornos mentales | | 23 | 100,00% | 63255 | 100,00% | 63278 | |
| Trastornos del Humor (Afectivos) | Depresión refractaria | 0 | 0,00% | 4997 | 7,90% | 4997 | NA |
| | Depresión grave con psicosis | 2 | 8,70% | 6019 | 9,52% | 6021 | 0.8934 |
| | Depresión con alto riesgo suicida | 1 | 4,35% | 4348 | 6,87% | 4349 | 0.6321 |
| | Depresión post parto | 0 | 0,00% | 90 | 0,14% | 90 | NA |
| | Trastorno bipolar | 3 | 13,04% | 6800 | 10,75% | 6803 | 0.7226 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo de sustancias psicotrópicas | Consumo perjudicial o dependencia de alcohol | 1 | 4,35% | 1636 | 2,59% | 1637 | 0.5947 |
| | Consumo perjudicial o dependencia como droga principal | 0 | 0,00% | 1564 | 2,47% | 1564 | NA |
| | Policonsumo | 1 | 4,35% | 2356 | 3,72% | 2357 | 0.8746 |
| Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia | Trastorno hiperactivo | 1 | 4,35% | 2956 | 4,67% | 2957 | |
| | Trastorno disocial desafiante y oposicionista | 0 | 0,00% | 289 | 0,46% | 289 | |
| | Trastorno de ansiedad de separación en la infancia | 0 | 0,00% | 99 | 0,16% | 99 | |
| | Otros trastornos del comportamiento de las emociones de comienzo habitual | 1 | 4,35% | 5267 | 8,33% | 5268 | |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|--------|-------|--------|--|
| en la infancia y en la adolescencia | | | | | | | |
| Trastornos de ansiedad | 6 | 26,09% | 16603 | 26,25% | 16609 | 0.9860 | |
| Alzheimer y otras demencias | 1 | 4,35% | 2468 | 3,90% | 2469 | | |
| Trastornos conductuales asociados a demencia | 0 | 0,00% | 464 | 0,73% | 464 | | |
| Esquizofrenia | 3 | 13,04% | 6155 | 9,73% | 6158 | 0.5920 | |
| Primer episodio de esquizofrenia con ocupación regular | 0 | 0,00% | 311 | 0,49% | 311 | | |
| Trastornos de la conducta alimentaria | 0 | 0,00% | 668 | 1,06% | 668 | | |
| Retraso mental | 0 | 0,00% | 1981 | 3,13% | 1981 | | |
| Trastorno de personalidad | 4 | 17,39% | 8354 | 13,21% | 8358 | 0.5535 | |
| Trastornos generalizados del desarrollo | 1 | 4,35% | 1305 | 2,06% | 1306 | 0.4410 | |
| Otras | 8 | 34,78% | 2065 | 3,26% | 2073 | 0.0000 | |

Elaboración propia.

P8: Programa de Rehabilitación física

Se dispone de datos relativos a población inmigrante la sección A.

Sección A: existencia de población en control programa de Rehabilitación física

Existen 1746 hombres y 1540 mujeres migrantes internacionales inscritas en el programa de rehabilitación física. Las principales razones de inscripción en migrantes son de origen físico: origen no traumático, traumático, y artrosis leve de rodilla y cadera.

Patrones similares se observan en las XV regiones del país, tal y como se detalla en Anexo 15.2.

Tabla 21.1 Población en control en el programa de Rehabilitación física. Total País Hombres, año 2016.

| Origen | Problemas de Salud | Total de Hombres Inmigrantes | % de Hombres Inmigrantes | Total de Hombres Chilenos | % de Hombres Chilenos | Total de hombres | p-value |
|--|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Número de personas en control en el programa | | 746 | 100,00% | 48687 | 100,00% | 49433 | |
| Origen Físico | Origen Traumático | 146 | 19,57% | 7810 | 16,04% | 7956 | 0,0092 |
| | Origen no Traumático | 252 | 33,78% | 16118 | 33,11% | 16370 | 0,6975 |
| | Artrosis leve y moderada de rodilla y cadera | 85 | 11,39% | 8349 | 17,15% | 8434 | 0,0000 |
| | Secuela de ACV | 42 | 5,63% | 4617 | 9,48% | 4659 | 0,0004 |
| | Secuela de TEC | 16 | 2,14% | 259 | 0,53% | 275 | 0,0000 |
| | Secuela de TRM | 2 | 0,27% | 623 | 1,28% | 625 | 0,0141 |
| | Secuela de quemadura | 1 | 0,13% | 65 | 0,13% | 66 | 0,9968 |
| | Enfermedad de Parkinson | 9 | 1,21% | 1520 | 3,12% | 1529 | 0,0027 |
| | Otro déficit secundario con compromiso neuromuscular en menor de 20 años congénito | 6 | 0,80% | 845 | 1,74% | 851 | 0,0523 |
| | Otro déficit secundario con compromiso neuromuscular en menor de 20 años adquirido | 2 | 0,27% | 322 | 0,66% | 324 | 0,1865 |
| | Otro déficit secundario con compromiso neuromuscular en mayor de 20 años | 30 | 4,02% | 2795 | 5,74% | 2825 | 0,0447 |
| | Otros | 57 | 7,64% | 6175 | 12,68% | 6232 | 0,0000 |
| | Congénito | 1 | 0,13% | 30 | 0,06% | 31 | 0,4329 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|-------|-----|-------|-----|--------|
| Origen Sensorial Visual | Adquirido | 1 | 0,13% | 102 | 0,21% | 103 | 0,6538 |
| | Otros | 1 | 0,13% | 22 | 0,05% | 23 | 0,2640 |
| Origen Sensorial Auditivo | Congénito | 1 | 0,13% | 28 | 0,06% | 29 | 0,3916 |
| | Adquirido | 1 | 0,13% | 94 | 0,19% | 95 | 0,7149 |
| | Otros | 7 | 0,94% | 65 | 0,13% | 72 | 0,0000 |

Elaboración propia.

Tabla 21.2 Población en control en el programa de Rehabilitación física. Total País Mujeres, año 2016.

| Origen | Problemas de Salud | Total de Mujeres Inmigrantes | % de Mujeres Inmigrantes | Total de Mujeres Chilenas | % de Mujeres Chilenas | Total de Mujeres | p-value |
|--|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Número de personas en control en el programa | | 1540 | 100,00% | 96983 | 100,00% | 98523 | |
| Origen Físico | Origen Traumático | 256 | 16,62% | 10550 | 10,88% | 10806 | 0,0000 |
| | Origen no Traumático | 662 | 42,99% | 40292 | 41,55% | 40954 | 0,2548 |
| | Artrosis leve y moderada de rodilla y cadera | 226 | 14,68% | 26312 | 27,13% | 26538 | 0,0000 |
| | Secuela de ACV | 23 | 1,49% | 3761 | 3,88% | 3784 | 0,0000 |
| | Secuela de TEC | 10 | 0,65% | 121 | 0,12% | 131 | 0,0000 |
| | Secuela de TRM | 1 | 0,06% | 723 | 0,75% | 724 | 0,0019 |
| | Secuela de quemadura | 2 | 0,13% | 55 | 0,06% | 57 | 0,2362 |
| | Enfermedad de Parkinson | 6 | 0,39% | 1510 | 1,56% | 1516 | 0,0002 |
| | Otro déficit secundario con compromiso neuromuscular en menor de 20 años congénito | 6 | 0,39% | 555 | 0,57% | 561 | 0,3446 |
| | Otro déficit secundario con compromiso neuromuscular en menor de 20 años adquirido | 3 | 0,19% | 331 | 0,34% | 334 | 0,3265 |
| | Otro déficit secundario con compromiso neuromuscular en mayor de 20 años | 52 | 3,38% | 4603 | 4,75% | 4655 | 0,0120 |
| | Otros | 106 | 6,88% | 10077 | 10,39% | 10183 | 0,0000 |
| | Congénito | 1 | 0,06% | 28 | 0,03% | 29 | 0,4130 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|-------|-----|-------|-----|--------|
| Origen Sensorial Visual | Adquirido | 2 | 0,13% | 137 | 0,14% | 139 | 0,9059 |
| | Otros | 1 | 0,06% | 34 | 0,04% | 35 | 0,5370 |
| Origen Sensorial Auditivo | Congénito | 1 | 0,06% | 29 | 0,03% | 30 | 0,4343 |
| | Adquirido | 1 | 0,06% | 83 | 0,09% | 84 | 0,7830 |
| | Otros | 2 | 0,13% | 94 | 0,10% | 96 | 0,6810 |

Elaboración propia.

P11: Programa de infecciones de transmisión sexual - VIH / SIDA

Se dispone de datos relativos a población inmigrante para ambas secciones.

Sección A: población en control del programa de VIH/SIDA (Uso exclusivo Centros de Atención VIH-SIDA)

De acuerdo a los registros REM 2016, existen 741 personas migrantes internacionales con VIH y SIDA, contra más de 19 mil personas nacidas en Chile (*Tabla 22.1*), de las cuales 668 están con terapia antiretroviral y 85 sin terapia antiretroviral.

El análisis estratificado por región del país indica que existen 55 casos en la segunda región, 11 casos en la V, 7 casos en la VIII, 521 en la RM y 11 en la XV región (*Tabla 22.2*).

Tabla 22.1 Población en control del programa de VIH y SIDA. Total País, año 2016.

| Concepto | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------|---------|
| Nº de personas con VIH/SIDA | 741 | 100,00% | 19060 | 100,00% | 19801 | |
| Nº de personas VIH/SIDA con TARV | 668 | 90,15% | 17297 | 90,75% | 17965 | 0.5795 |
| Nº de personas VIH/SIDA sin TARV | 73 | 9,85% | 1763 | 9,25% | 1836 | 0.5795 |

Elaboración propia.

Tabla 22.2 Población en control del programa de VIH y SIDA. Total por región del país, año 2016.

| Región II | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| N° de personas con VIH/SIDA | 84 | 100,00% | 737 | 100,00% | 821 | |
| N° de personas VIH/SIDA con TARV | 78 | 92,86% | 695 | 94,30% | 773 | 0.5930 |
| N° de personas VIH/SIDA sin TARV | 6 | 7,14% | 42 | 5,70% | 48 | 0.5930 |
| Región III | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
| N° de personas con VIH/SIDA | 0 | | 443 | 100,00% | 443 | |
| N° de personas VIH/SIDA con TARV | 0 | | 414 | 93,45% | 414 | |
| N° de personas VIH/SIDA sin TARV | 0 | | 29 | 6,55% | 29 | |
| Región IV | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
| N° de personas con VIH/SIDA | 0 | | 641 | 100,00% | 641 | |
| N° de personas VIH/SIDA con TARV | 0 | | 551 | 85,96% | 551 | |
| N° de personas VIH/SIDA sin TARV | 0 | | 90 | 14,04% | 90 | |
| Región V | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
| N° de personas con VIH/SIDA | 17 | 100,00% | 1205 | 100,00% | 1222 | |
| N° de personas VIH/SIDA con TARV | 14 | 82,35% | 1121 | 93,03% | 1135 | 0.0892 |
| N° de personas VIH/SIDA sin TARV | 3 | 17,65% | 84 | 6,97% | 87 | 0.0892 |

| Región VI | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| N° de personas con VIH/SIDA | 0 | | 56 | 100,00% | 56 | |
| N° de personas VIH/SIDA con TARV | 0 | | 29 | 51,79% | 29 | |
| N° de personas VIH/SIDA sin TARV | 0 | | 27 | 48,21% | 27 | |
| Región VII | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
| N° de personas con VIH/SIDA | 0 | | 883 | 100,00% | 883 | |
| N° de personas VIH/SIDA con TARV | 0 | | 795 | 90,03% | 795 | |
| N° de personas VIH/SIDA sin TARV | 0 | | 88 | 9,97% | 88 | |
| Región VIII | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
| N° de personas con VIH/SIDA | 15 | 100,00% | 2145 | 100,00% | 2160 | |
| N° de personas VIH/SIDA con TARV | 11 | 73,33% | 1950 | 90,91% | 1961 | 0.0190 |
| N° de personas VIH/SIDA sin TARV | 4 | 26,67% | 195 | 9,09% | 199 | 0.0190 |
| Región IX | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
| N° de personas con VIH/SIDA | 0 | | 787 | 100,00% | 787 | |
| N° de personas VIH/SIDA con TARV | 0 | | 752 | 95,55% | 752 | |
| N° de personas VIH/SIDA sin TARV | 0 | | 35 | 4,45% | 35 | |
| Región X | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| N° de personas con VIH/SIDA | 8 | 100,00% | 1141 | 100,00% | 1149 | |
| N° de personas VIH/SIDA con TARV | 8 | 100,00% | 1113 | 97,55% | 1121 | |
| N° de personas VIH/SIDA sin TARV | 0 | 0,00% | 28 | 2,45% | 28 | |
| Región XIII | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
| N° de personas con VIH/SIDA | 588 | 100,00% | 9991 | 100,00% | 10579 | |
| N° de personas VIH/SIDA con TARV | 533 | 90,65% | 8923 | 89,31% | 9456 | 0.3068 |
| N° de personas VIH/SIDA sin TARV | 55 | 9,35% | 1068 | 10,69% | 1123 | 0.3068 |
| Región XIV | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
| N° de personas con VIH/SIDA | 0 | | 362 | 100,00% | 362 | |
| N° de personas VIH/SIDA con TARV | 0 | | 345 | 95,30% | 345 | |
| N° de personas VIH/SIDA sin TARV | 0 | | 17 | 4,70% | 17 | |
| Región XV | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
| N° de personas con VIH/SIDA | 29 | 100,00% | 669 | 100,00% | 698 | |
| N° de personas VIH/SIDA con TARV | 24 | 82,76% | 609 | 91,03% | 633 | 0.1334 |
| N° de personas VIH/SIDA sin TARV | 5 | 17,24% | 60 | 8,97% | 65 | 0.1334 |

Elaboración propia.

Sección B: población en control por comercio sexual (Uso exclusivo de Unidades Control Comercio Sexual)

Los registros de estadísticas mensuales indican que el Chile el 2016 hubo 696 mujeres en atención de control por comercio sexual y que eran migrantes internacionales, comparado con 2595 de mujeres de origen chileno (Ver *Tabla 23.1*).

Tabla 23.1 Población en control por comercio sexual. Total País y por región, año 2016.

| Región | Total Inmigrantes | % de Inmigrantes | Total Población Chilena | % Población Chilena | Total | p-value |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 1 | 0 | 0,00% | 83 | 4,37% | 83 | NA |
| 2 | 27 | 3,88% | 82 | 4,32% | 109 | 0.6216 |
| 3 | 22 | 3,16% | 15 | 0,79% | 37 | 0.0000 |
| 4 | 79 | 11,35% | 57 | 3,00% | 136 | 0.0000 |
| 5 | 0 | 0,00% | 136 | 7,16% | 136 | NA |
| 6 | 115 | 16,52% | 324 | 17,06% | 439 | 0.7458 |
| 7 | 25 | 3,59% | 320 | 16,85% | 345 | 0.0000 |
| 8 | 16 | 2,30% | 315 | 16,59% | 331 | 0.0000 |
| 9 | 68 | 9,77% | 147 | 7,74% | 215 | 0.0966 |
| 10 | 77 | 11,06% | 80 | 4,21% | 157 | 0.0000 |
| 11 | 50 | 7,18% | 43 | 2,26% | 93 | 0.0000 |
| 12 | 0 | 0,00% | 18 | 0,95% | 18 | NA |
| 13 | 217 | 31,18% | 251 | 13,22% | 468 | 0.0000 |
| 15 | 0 | 0,00% | 28 | 1,47% | 28 | NA |
| Total general | 696 | | 1899 | | 2595 | |

Elaboración propia.